

¶ Auicenna

ARABIS MED

CORVM OB SVCCINCTA

brevitatis copiã, facile principis

Quarta fen, primi, de uniuer

ſali rõe medēdi nunc pri

mū M. Iacob. Mātini,

medici he

bræi, latinitate donata, & in ſtud

forū utilitatē, ab Phificæ ſtudi

ſis quibusdam, germanis

typis tradita.

M D XXXI.



Thobaldus Jostius

ANDREAE GRITI, SERENISS.
ACEXCELLEN. VENETIARum

Principi, Iacob Mantinus

Hebraeus secundam

optat fortunam.




Nter eos qui hactenus
Arabice de medica arte
scripsere, Serenissime
Princeps, clarissima oim
confessiōe, Primus Auicenna
gloriæ locus attributus
est. Nam licet, q̄ composuit ab
antiquioribus, præsertim græcis,
copiosissime ornatissimeq;
tradita fuerit, ea tamen
omnia doctissimus ipse felici
breuitate, in mirificum redegit
ordinem, ita, ut eo docente
multo facilius quam aliis
omnibus, ea quæ ad medendi
rationem pertinent, percipi
ualeant. Quare velut lege
quadam sancitum est, vt in
publicis gymnasiis, Auic.
opera maxima animorum
satisfactione legant, eiusq;
libri plurimos

rimos expositores habuerint, quod non
itidē cæteris obtigisse videmus. Sed quā
am Auicenna in scribendo gentilitio ac
sibi peculiari, Arabico idiomate usus ē,
quod a latinis hominibus non ita facile
comparatur, eius operum traductio ma-
ximis ac multis erroribus scatet, quos
Andræas Beluensis, ætatis nostræ medi-
cus insignis & Arabica latinaq; lingua
pariter eruditus, magna ex parte lauda-
biliter emendauerit, alieno tamen semi-
ne campum penitus expurgari nō potuit
sed adhuc plurima relictā sūt quæ velut
nebula quadā veritatem lectionis ob-
ducāt. Quā obrem ego qui nihil magis
propriū hominis esse semper existima-
uerim, q̃ quoquo modo vniuersis vtili-
tatem conferre mortalibus, Quēadmo-
dum pleraq; in variis facultatibus ex he-
braico in latinum sermonem conuerti,
ita nunc aliq̃s Auicennæ cōmentarios
aggressus, eos maculis omibus emenda-
tos ac quoad fieri possit, absolutissimos

latinitate donatos, tanquā euidentis animi mei indicium legentibus offerre decreui. Qui postquā meam cū aliorum interpretationibus cōparauerint, quid mihi debeant ipsi viderint. Cum autē tres potissimū Auicennæ partes in gymnasiis publice legātur, videlicet prima pars primi libri, quæ prima sen primi dicitur, & quarta, quæ quarta sen primi nuncupātur ac prima pars quarti libri, quæ priā sen quarti appellatur, ea omnia in latinam orationē vertere proponēs, a quarta sen primi libri interpretari exorsus sū, quia hæc pars maiorem cæteris in uniuersali medendi arte vtilitatem afferre videtur & hanc primo in lucē edere uolui. Mox autem annuente deo opio max. ad reliquas expediendas accingar. Cum uero omnes fere qui aliquod literarium opus in lucem edere meditātur, alicuius patrocinio cōmendatū emittāt. Idem mihi facere cogitanti, tua vere serenitas occurrit, quæ tanta est vt quascūq; animi tenebras

bras atq; perturbationes solo intuitu discutere ualeat. Quando ea te pulchritudine atq; dignitate corporis exornari contigit, ut nemo te conspectior hactenus imperasse credatur, cui animi pulchritudo, cum prudentia, tum consilii maturitate ut effectus ipsi probant, ac oim moralium virtutum probitas eque respondet, tibi potissimum duabus de causis, hanc editionem nostram debere arbitror, vel quia vestro florētissimo studio patauio a puero fuerim semper addictus, nunc vero precipue ob egregiam eorum eruditionem qui ibi publice profitentur, vel quoniam Respub. cui tu merito præsides iustius antiquioribus præponenda quam recentioribus comparanda, ita de me iam merita est, ut omnia illi debeam, omnia optem. Ne vero in dicendo sum prolixior quam ipsa res postulare videtur, has princeps illustriss. tuo nomini dicatas elucubrationes suscipe, tuacq; si opus fuerit auctoritate defende. Non quod eas te dignas exist

Itimen, sed vt mea tibi mens aliquando
manifesta fieret, q̄ publice ac priuatim
huic ciuitati pro viribus in seruire
proposuit. Nec tamen gratū
ideo tibi minus me futu-
rum spero, cū
quī quod po-
test dat, om-
nia dedisse censeri
debeat. Va-
le.



FEN

FEN QVARTA PRIMI LIBRI
AVICENNAE, IACOB. MAN-
tino Hebræo Medico inter
prete.

Fen quarta de rationum medēdi diuifio
ne, 31. capitibus diftincta.

Caput primū fen quartę, fermo vniuer-
falis de medendi ratione.



VRATIONEM aliquo triū
perfici dicimus, vel regimine
& ipfo uictu, vel medicaminū
vfu, aut manus artificio (quod
chirurgia appellatur) itelligo aut per re-
gimen vsum caufarum neceffariū, quæ
iam iuxta cōmūnem confuetudinē enu-
meratæ funt, in quibus victus ipfe cōti-
netur; Iudiciā autē regiminis, fi eorum
qualitatem fpectes, fimilia plane fūt me-
dicaminum iudiciis. Verum inter
hæc, ipfa victus ratio quoad quātitatem

CAPVT

iudicia sibi propria habet: nam quādoq;
 alimētum tollimus, quādoq; minūimus
 nō nunquā equamus, & interdum auge-
 mus, aufertur in totum alimentum, cum
 medicus cupit naturam uacare humorū
 coctioni. Minuitur vbi studet vt vires a
 limento conseruentur, & tū virium cus-
 ram habet, vel fortasse minuitur vt ma-
 teriæ prospiciatur, ne scilicet natura sit
 circa nutrimentū multitudinē impedita.
 Interim tamen semper curæ sit id quod
 magis vrget, ut quod prestantius sit, ne-
 pe vires ipsę, præsertim si admodum im-
 becilles fuerint. Cæterū alimentū dupli-
 citer minuitur, quantitate, aut qualitate,
 aut si liceat tertium ex his duobus cōsti-
 tuere modū, potes. Interest autem inter
 quantitatem. & qualitatem, quoniam in-
 terdum alimētum est multum in quanti-
 tate parū nutriens tamen, vt sunt olera
 & fructus. Multiplicare enim hæc, est
 multiplicare quantitatem alimenti, non
 eius qualitatem. Et quādoq; alimentū
 est

est exiguum inquantitate, multum tamē
quoad nutritionem, vt sunt oua & testes
pullorū gallinaceorū. Nos aut quandoq;
qualitatē minuere, quātitatē vero auget
cogimur, vt cum appetitus ad cibum ve
hemens fuerit, & in uenis humores cru
di fuerint, ubi nos huiusmodi appetenti
am replēdo uentriculū sedare curamus,
illumq; humorem exuperantem a uenis
arcere, vt si quid est in eis primo conco
quant, alijsq; rationibus prēter has, id fa
cimus. Nonnūquam etiam qualitātē au
get, quātitatem vero minuere debemus,
vt cum vires roborare cupimus, sed ipsa
natura ventriculi imbecillior reddit, vt
ad cōcoctionem pleniorē, se validam
reddere nequeat. Minorare aut vel aufe
rre alimentū quarimus, cum morbos
acutos curamus. Nam etsi in diuturnio
ribus victum quoq; minuiamus, minus
tamen quam in acutis: quoniam vires
magis obseruamus in morbis diuturnis
cum horum iudiciū ac uigorem, satis

CAPVT

distat nō ignoremus, q̄ nisi fieret, nequa
 quā posset vsq̄ ad tēpus iudicii uirtus cō
 seruari, nec durātē diu tempōr cōcoctio
 nis, cōcoquere quidem posset. At acuto
 rum morborū iudicium propinquū est,
 ita ut ante eorū uigorem uires ad modū
 dissolui non dubitemus. Vel si id timu
 erimus, non tamen usq̄ adeo alimētum
 minuemus. Cūq̄ egritudo propinquior
 fuerit principio, casusq̄ mītiōres fuerit,
 tunc egrū alemus his, quæ uires fouēt.
 Sed quādo egritudo processerit in cres
 cendo, casusq̄ ipsi augescē ceperint, tūc
 alimētum minuemus, cum quia in nos
 tro p̄cedenti uictu, iam intrepide con
 fidimus, tum etiam ut tempore quo uir
 tus certat, eā exoneremus. In uigore au
 tem consistendi, uictum in extremo atte
 nuare studebimus, & quāto morbus acu
 tior, eiusq̄ iudicium propinquius fuerit,
 tanto uictum magis attenuabimus: nisi
 aliquæ superuenerit causæ, quæ nos id a
 gere impediāt, ut in p̄ticulari nostra cō
 menta

meditatione id a nobis explicabit: Alimentum insuper ea ratione qua alit, duo alia habet officia, nempe vel quod cito penetrat ut uinum, vel tarde, ut assata, & tosta: ad haec aut quod id quoque sanguis quod ex eo generatur, est crasse ac tenacis substantie, ut est alimentum carnis porcinae & uulinae, aut tenue & facile aptum dissolui, ut est id quod ficibus uinoque constat. alimento igitur quod cito penetrat indigemus, cum uitalem virtutem deficientem subleuare, eamque excitare desideramus, ubi ventriculus aut virtus non perficiunt concoctionem cibi tarde concoctionis: Cauebimus autem cibum concoctu facilem, ubi contingat precessisse alimentum tardae concoctionis: Timendum enim est, ne illi admisceatur & ad illum modum iam prius nobis expositum res reuertatur. A crasso vero abstinebimus ubi metus impendit de obstructionis aduentu, alimentum tamen validissime nutritionis, tardaeque concoctionis eligimus, ubi

CAPVT

ubi quempia roborare, cumq; validis exercitatiōibus tradere cupimus: sed leue præligimus alimētum ei, qui in meatu um obstructionem facile incurrit.

Vsus autem medicaminum tres cōtinet regulas: prima in eligenda qualitate ipsius medicaminis consistit: uidelicet vel calidi, v^{el} frigidi, uel humidi, vel sicci: Secunda in quantitate deligenda, quæ quidem bifaria diuiditur: nempe vel in mēsuram ponderis eius, vel in metiendam eius qualitatem, hoc est gradum caloris aut frigoris eius aut alterius id genus.

Tertia autem consideratio est ipse ordo temporis eius. dirigit itaq; nos ad qualitatem medicaminis simpliciter eligendā cognitio generis morbi, qm̄ cognita ægretudinis qualitate, eligendum est medicamentum illi sua qualitate contrariū cum morbus suo curetur cōtrario, sanitas vero suo simili seruetur. At mensura quantitatis eius iuxta illos duos modos simul cognoscitur, coniectura artificiosa,

sa, ex mēbri natura, magnitudineq; mor-
bi, & ex his quæ sua cōueniētia, seu simi-
litudine id significant, quæ quidem sunt
maris ac femine differentia, ætates, con-
suetudo, tempus aīi, & regio, & ars, &
robur & habitus corporis atq; color. Ad
cognitionem autem naturę mēbri quat-
tuor sunt cognoscenda. nempe membri
tēporatura, eiusq; formatio, positus, uis
resq; ipsius. cognita. n. naturalis mēbri tē-
peratura simul cum morbose temperatu-
ræ magnitudine, cōiectura prorsus cog-
noscetur quantum quis recedat a suo na-
turali temperamento, ut sciatur quonā
indigiat ut sibi restituatur. ut gratia exē-
pli si salubre tēperamentū alicuius frigi-
dum fuerit. morbus vero calidus, tunc
is a sua temperatura magno distat reces-
su, magnaq; indigebit refrigeratione, q;
si utrūq; calidum fuerit, exigua refrige-
ratio satis erit. Cæterum quod ad forma-
tionem ipsius particulæ attinet, iam no-
bis dictū est: quot res in se includat: qua

rerecurrať ad eũ locũ. Hoc tamen te scia
 re licet, aliquod esse mēbrũ quod ex sui
 formatiōe habet tam intra se q̃ extra fa
 ciles meatus, unde tenui ac mediocri me
 dicamē, excrementũ expellitur. Aliq̃p
 vero aliud non ita se habet, quo fit, ut ua
 lentius exigat medicamē. Est & aliud fũ
 gosũ, aliud vero densum. Rarũ autē, te
 nue medicamen desiderat, densum uero
 validiori idiget. Membra præterea, quæ
 validius medicamen postulāt sunt, quæ
 ex neutra parte cauitatem aut intercape
 dinem habent: minus autem quæ in alte
 ra tantum parte. Præterea minus quæ in
 vtrac̃ parte conceptaculũ obtinent, sed
 sunt densæ astrictæq̃ substātiæ, vt renes.
 Minus iterũ hđ utrinq̃ habet concaui
 tatem, & est rarę substātiæ, ut pulmo.
 Per sitũ vero ut nosti itelligimus, vel lo
 cum, uel consensũ: notitia igitur cōmu
 nicationis membri tunc quidem maxie
 tibi conducit, cum aliquod medicamen
 ad aliquam partem trahere, aut reducerē
 decre

decreueris, ueluti causa exempli, ubi materia in gibbosa parte iecinoris consederit, eā urina, ubi uero in caua, aluo euacuabimus: Quoniā gibbosa epatis pars cum membrīs urinæ, & eius concaua cū intestinīs cōmunicationem habent.

Notitia uero loci tripliciter opē fert, primo quidē uicinitate uel distātia ipsius: nā si p̄p̄iquus fuerit locus ut stomachus modica medicamenta ad eum perueniēt in eundemq; agēt. Sed si remotus ut pulmō, uis profecto medicamentorū medio criū remittetur anteq̃ ad eum pertingēt. idcirco multo ualētiora pro eo requirūt præsidiā. At si uicina fuerit particula, quā medicamētū pertigerit, tunc tāta debet esse uis illius medicamēti, quāta morbo sit opposita. Sed si situs longius absit ita ut si id medicamentum eo penetrare debeat, magnam uim penetratiuā requirat, tunc plus æquo uim medicamēti augere oportebit, ut in emplastro coxendicis, & cæteris alijs id genus fieri solet.

Secundo vero notitia eorum quæ admisceri debent medicamentis, ut cito ad membrum perueniant, ueluti in medicamentis membrorum urinæ, admiscetur quæ urinam cient. in cordialibus vero crocus.

Tertio denique ut sciatur quomodo ipsi membro ad mouendum sit medicamentum, ut gratia exempli. Si ulcus in inferioribus intestinis insidere scierimus, tum illud clysteri pertingimus, quod si in supremis id esse cōiicerimus, tunc per ea quæ bibuntur.

Nōnunquam adhuc obseruare locum & cōsensum simul sūmopere cōducet, ueluti cum materia iam perfecte fluxerit ad membrum, quid nam agere nos conuenit, ubi uero materia adhuc fluit, quid iterum nos agere deceat. nā si adhuc fluat, eam a suo auertemus loco, quattuor tamen cōditionibus prius consideratis.

Prima est ad prem oppositā auersio, quā antispasin græci dicunt, ut cū ex dextra ad leuā

ad leuam reuellimus partem, sursumque ab his que infra sunt & contra. Secundo si consensum seruaueris, ut mensibus confer tim erumpentibus, eos quidem sistes, si magnas cucurbitas sub manibus defixeris tanquam ad affinem locum reuocans.

Tertio pars e regione sita inspicienda est ut cum in iecinatoris affectibus uenam brachii dextri, in ternam (quam basilicam appellant) incidimus, in lyenis uero sinistra.

Quarto distantia animaduertenda est, ne ad locum nimis uicinum reuocemus. At cum materia iam fluxerit utrumque horum conducit, nempe quia ab ipso membro eam excipimus, aut ad uicinam sociamque particulam reuocamus, & ab illa eam extrahimus ueluti in affectibus uteri uenam malleoli (saphenam uocant) incidimus. eam uero quae sub lingua est in affectibus utriusque tonsillae, seu glandulae gutturis, quas duras amigdalas vocant.

At cum ad contrarium locum reuellere desideras, primo quidem dolorem illius par

ticulæ, a qua retrahitur mitiga, animad-
 uerteq; ne trāsitus fiat per mēbrū nobile
 Notitia prætercauiriū mēbri triplici
 confert. Primo quidē inspicerē oportet
 an nobile sit & princeps. Nam in his nō
 debemus uti quoad fieri potest fortibus
 medicaminibus, qm̄ vniuersum ledere-
 remus corpus. Nec quod ex cerebro aut
 epate euacuare oportet haud quaquam
 semel euacuabimus, neq; vehemēt omni-
 no infrigidabimus. Porro cum medica-
 mina dissoluētia epati emplastris superi
 ponere velimus, nequaq; talia appona-
 mus nisi admixtis secum astringentibus
 odoratis, vt uirtus custodiatur. itidem a-
 gendum est in his quæ potu ad id damus
 Cor uero inter cetera mēbra maxime ob-
 seruandum, quod ad hoc attinet mox ce-
 rebrum, deinde epar.

Secundo membrum quod habet cōmu-
 ne officium animaduersione, dignū est,
 et si non sit principale vt uentriculus &
 pulmo, idcirco uentriculo existenti im-
 becilli

becilli in feb. uero non licet aquā valde
frigidā potu dare. Nec te latere uelim q̄
apponere super membra principalia, &
quæ eis vicina sunt, medicamina exqui-
site mollientia magnum periculum uitæ
afferat. Tertio sensus acumen eiusq̄ he-
betudo, haud quaquā negligēda est. nam
apponere medicamenta uitiosa qualita-
tis & mordicantia atq̄ nocua, ut elateria
& id genus alia super mēbra neruea, quæ
sensus acumen habent cauendum. Tria
adhuc sunt genera medicamentorum a
quibus abstinendum est, nempe vel quæ
dissoluunt, vel quæ extreme infrigidant
vel quæ oppositas habent qualitates, ut
erugo cris & cerusa & plūbū & æs ustū,
& his similia. Hæc inq̄ est distinctio me-
dicamenti assumpti ex natura membri.
Ad magnitudinē autem morbi reuertē-
dum est quicunq̄ igitur gratia exempli,
calorem morbosum sui corporis habue-
rit, extinguere quidē debet frigidiori me-
dicamento. Si uero frigiditas accidenta-

PRIMUM

lis eius valida fuerit calidiori medicamēto calefacere oportebit, q̄ si neutrum eorum validum fuerit, sufficit nobis medicamentum minus ualidum.

Id uero quod ad tēpus morbi attinet scire licet, in quonam temporū morbus sit ut exēpli causa, si abscessus fuerit in suo principio admouēda sunt, quæ repellāt tantū. Sed si uigore suo cōstiterit, quæ tantum dissoluant. In mediō autem istorum temporum permiscenda hæc sunt.

Quod si morbus acutus inter initia fuerit, tunc modice regimen attenuabimus. In consistentia uero extreme uictus attenuādis est. At si morbus diuturnior fuerit tum tenui uictu initio non utemur. Apud statū uero, modico uictu uti licet. Et si complures morbi diuturni, præter febres, uictu tenui soluantur. itidem cū materia ægritudinis multa fuerit, eiusq̄ caliditas multa, tunc in principio euacuare cōuenit, nec cōcoctionem expectabimus, q̄ si mediocris fuerit cōcoquere, ac

eua

euacuare conueniet. Indicia autē arerū
conuenientia seu similitudine snmpta,
facile poteris cognoscere, ex quarum ge
nere est aer, qui quidem maxime consi
derandus est curationi ne, an morbo uim
afferat. Porro ægritudines periculosa
in quibus si debita utamur mora, ac mi
noratione seu alleuiatiōe, nec adhuc si
mus in tuto de virtutis deliquio, tūc pri
mo a forti curatiōe incipere cōsentaneū
esse dicimus. Qd si nullū est in eis peri
culum, tunc sensim ad fortiorem proce
dendum est, si leuior non suffecerit. Cas
ue præterea ne ab eo quod conuenit age
re declines, quamuis impressio tardaue
rit, ne persistas ī errore aliquo, & si eius
nocumentum non apparuerit, nihilomi
nus nō permanes in unico remedio in
eadem curatione, sed ad aliud pertran
seas. Quoniam corpus non afficitur a re
consueta. Quodlibet præterea corpus,
quodlibetq; mēbrum imo idem corpus
idemq; membrū, in diuersis temporibus

proprietatē habet, ut possit ab aliquo re-
medio affici, ab aliquo uero non. Cum q̄
ignoraueris morbum, cōmitte cum natu-
rā, nec precipitāter agas, qm̄ vel ipsa na-
tura morbum euincet, vel monstrabit.

Ceterū ubi morbus cōiunctus fuerit do-
lori aut causę doloris vel inferēti dolorē
ut est uulnus uel casus, tunc a mitiganti-
bus dolorem inchoandū est. Et cum usu
soporificorum indigueris, ne pertranse-
as quale est papauer. cū hoc enī quod so-
porificā vim habet familiare est. q̄ si ex
vehementi sensu membri ledatur, alatur
his quæ sanguinem multo crassiorē red-
dunt, vt frumentum coctum. At si infri-
gitationem non vercaris, cibetur rebus
frigidis, vt est lactuca & id genus alia.

Porro scias q̄ inter cætera remediā opti-
mū est recurrere ad quod vires tum ani-
males tum vitales validas reddat, ut leti-
tia & occurus rei gratę, & iugiter uti his
quibus gaudio afficitur. immo fortasse
iuuabit assidua consuetudo, cū viris pre-
stantiss.

stantiff. & cū his quos reueretur. prohibet enim ægrotum a rebus q̄ nocent ei.

Proximum aut̄ huic generi remediorū ē transferri de regione in regionem, & de aere in aerem, & de habitibus in alios habitus transmutari, & omni vti conatur vt habitus atq; motus exercean, quibus mēbrū æquetur, aut alicui t̄pamento restituantur, vt cū cogimus puerū strabum ī spicere oblique in rem splendidā, & qui habet torturam faciei, inspicere speculū chalybis. Sic enī faciē suā æquare conabitur, atq; oculos, ita vt fortasse tali solertia, reducetur ad correctionem.

Inter cætera præterea quantū poteris cauere debes. ne remediis vehemētibus tēpore non comodo ueluti ne magna solutione alui, vel vomitu & abscessuum apertione & vltione, quā cauteriū græci uocāt, tempore æstatis et hyemis utaris. Id vero quod in curationibus eximiā requirit considerationem, est ubi in codē morbo duo concurrunt q̄ contraria exigant

PRIMUM

vt si gratia exēpli, ipsa ægritudo aliquid exigat, cuius cōtrariū tñ eius causa expetit, vt est ipsa febris pituitosa. Hæc enim ratione sui caloris refrigerationem ratione uero materiæ, que est causa feb. calefactionem desiderat, et cōtra. itidem ubi morbus calefactionem & eius accidens infrigidationem postulat, ut materia doloris intestini colī, quæ quidem calefactione, aut discutientia, vel attenuantia exposcit, vehemēs tamē dolor eius refrigerantia, & soporifera requirit, & contra. Cæterum te latere non licet, q̄ nō q̄libet repletio, neq̄ quælibet mala temperatura curatur per contrariū, uidelicet per euacuationem & per cōtrariationē, seu per oppositam alterationem. Quoniā sæpissime vsus optimi regiminis, ad repletionem & malā temperaturā adhibiti satis sufficit.

Fen quartæ caput secūdū, de medicatiōe ægritudinū ex malo tēperamento ortaꝝ
Si mala



Si mala tēperatura sine materia fuerit, tunc ipsum temperamētum permutare tantum debemus, sed si cum materia fuerit euacuabimus quidē, et fortasse sola euacuatio satis erit vbi nulla mala temperatura, ex ipsa materia ob eius præcedentē infixionem relicta fuerit, fortasse tamen id nō erit satis, vbi vitiosa temperatura relicta fuerit, imo perfecta euacuatiōe temperamentum mutare oportebit. Ad hæc dicamus q̄ mala temperatura variis curatur morbis; nempe hæc uel erit iā infixa & tum eius cura fiet per cōtrarium absolute, & hæc est absoluta medicatiō, uel erit in fieri quā quidem corrigit ipsa medicatio facta cum præseruatiōe, vt gratia exēpli absoluta medicatio, est curare putredinem febris quartanæ medicamēto, quod ex vip̄eris cōficitur theriacem uocant & tertianā potu aq̄ frigida, vt flaua extinguitur bilis; & præcautio est ut in quartana ueratro, in tertiana scamoniō

PRIMUM

purges cū per id, principium futuræ ac-
 cessionis uitare intendimus. Cumq; de
 aliqua ægritudine ambigis utrū eius cau-
 sa fuerit caliditas vel frigiditas, & cus-
 pis id experiri nequaquam experiaris
 re modum excedente, & aduerte ne im-
 pressio per accidens facta te decipiat. Sci-
 as quoq; q̄ æquale est tempus, quo fit in-
 frigidatio & calefactio. Verum maior ē
 timor infrigidationis, quia calor est na-
 turæ amicus, in humectatione tamen &
 exiccatione æqualis est timor, verum ip-
 sa humectatio longius exposcit tempus.
 Humidū autem & siccum vtrumq; eorū
 conseruatur a sua ualidissima causa per-
 mutatur uero a uehementi causa sui con-
 trarij, et calidum quidē adaugeť illis cau-
 sis, quarum mentio iam a nobis plene fa-
 cta est. Deinceps quæ excrementa, et res-
 pletionem tollunt, et quæ obstructions
 recludunt. Mox eo quod ipsum conser-
 uat, quod quidem ē humidū æquale, fri-
 gidum uero ualidius reddit ob eius uali-
das

das causas, et ob caloris suffucationem
& per id quod ipsum vehementer dissol
uit, quod quidem est ipsa siccitas per se
et caliditas per accidens. Quicūq; aut
exuperantem calorem aperientibus re
mediis curare uelit ab imodica infrigi
datiōe caueat ne ilapidescētē facultatē,
& opilationem addat, ab imoderata quo
q; calefactione abstinere debet, quoniam
malam temperaturam calidā augeret sed
sensim pcedere debet, et primo q̄ deter
gūt, ad id qd infrigidari debet. Si aqua
ordei & aqua endiuīæ sufficiat, bene est
sed si id nō satis sit tūc mediocria admi
nistrāda sūt. Qd si ne hæc quidē satisfaci
ant utēdū est his quæ tenuē habēt calorē
intrepideq; id augere potes. quoniā ma
ius est iuuamentū infrigidationis, quod
sequitur ex apertiōe corū, q̄ nocumen
tū supercalefactionis ipsorum, q̄ quidē
facile poterit extigui post reclusionem.
Immoderata autem extictio coctionem
acrium humorū vetat, etsi nōnulli huius

aduersentur snie cum ignorent imodicā
 extinctionem uires deicere, et præserti
 quæ per ægritudinem imbecilliores ef-
 fectæ sunt, & quamuis materia sūmoper
 corrigat, quādoq; tamē reliquuntur post
 eam ægritudines, quæ ex mala tempera-
 tura frigida imateriali pendent, aut cum
 materia contraria illi temperaturæ quæ
 correctæ fuit. Porro frigida tēperatura
 cum iam infixa fuerit, videtur quoquo
 modo esse difficilis calefactionis. in prin-
 cipio uero est ad modum facile uerū in-
 frigidare summe calidam, & si sit diffici-
 le, facilius tamen est q̄ calefacere extre-
 me frigidam. Quoniam extrema frigidi-
 tas est ipsa mors naturæ, ei q̄ æquatur.
 Scias præterea q̄ in frigidatio quandoq;
 adiungitur siccitati, et quandoq; humidi-
 tati nōnūquam uero est expers utriusq;.
 Exiccatio autem frigiditatem iam factā
 fouet, humiditas uero eam quæ nunc sit
 magis inducit. nonnūquam præterea ad-
 iuuant siccitatem omnes causæ caloris q̄
 in extre


in extremo fuerint, & nōnūquam omnes
causæ imoderatæ frigiditatis humanita-
tem adiuvant, neq; quicq; adeo efficacit̃
id efficit, ut ociū & assiduius vsus lenium
balneorum et thermarum. Hoc aut̃ totū
iam in prioribus sermonibus notum fe-
cimus, vinum quoq; dilutum eximiā ha-
bet uim humectandi.

Scire adhuc debes q̃ cum senex indiget
refrigeratione et humectatiōe, ad id nō
est sufficiens id quod ad temperiem eū
deducat, imo quod ad eius frigidā et hu-
midam temperaturam in quam incidit
transeat, & si sit ei accidentalīs, est veluti
naturalis. Nec te lateat quod sapissime
qñ aliquam temperaturam imutare cupi-
mus cogimur facere, quæ eam validiorē
reddant, mixta cum re ei contraria, ut cū
cogimur vtī aceto cum medicamentis ca-
lescentibus ob eorum imbecillem vim
pp̃ quam ad aliquā particulam penetrā-
re q̃unt, itidem cogimur vtī croco in me-
dicamentis in frigidatibus cor, vt ad ipsū

CAPVT

perducatur. Multoties adhuc aliquod me-
dicamē habet validissimam vim permu-
tandi aliquam temperaturā, sed ob eius
tenuitatem non adeo imoratur vt suum
peragat officiū. tunc igitur oportet ei
admisceri aliquid quod illud crassius red-
dat detineatq; & si contrarium sue actio-
nis id inferat, vt cum oleo balsamino ce-
ram admiscemus, vel aliud vt in eo mem-
bro tātis per detineatur, dum possit fūgi
officio suo.

Caput tertium seu quarte. Quomodo &
quando fieri debeat euacuatio.

 Ecce sunt ea quæ rectum adfes-
runt iudiciū de euacuatiōe fa-
cienda, nempe repletio, vires, tē-
peratura, habitudines corporis, & acci-
dentia concurrentia, velut ne illi, quem
soluere uis acciderit iam solutio alui.

Quoniam in alui profluuiū aluū solue
re periculofum est, ad hęc ætates & tēpus
anni, & aeris cōstitutio, & regiōes & cōs
uetudo in euacuatiōe, & exercitia seu
artes. Hęc inq̃ si cōtrarium affirmādæ
euacuatiōis indicent, euacuatiōē quis
dem prohibebunt. Vacuitas namq̃ eua
cuationem ominō prohibet. Itidem &
imbecillitas cuius uis trium facultatum
Verum quandoq̃ præligimus debilita
tem alicuius virtutis, potius q̃ nocumē
tum quod sequi posset ex dimissiōe eua
cuationis, hoc autem in facultatibus sen
sus & motus, si confidamus rem pericu
losam corrigi posse cum acciderit. itidē
& in cunctis facultatibus fieri debet.
Temperatura prætera calida & sicca eua
cuationē phibet, itidem frigida & humi
da quæ caloris est expers, vel ibecillē ha
bet calorē, euacuatiōē vetat. calida vero
& humida eam satis admittit. Habitus
autē corporis idē facit, nā imoderata ma
cilentia & raritas copis, eā ipedit timorē

diffolutionis virtutis, & ideo cum rexe-
ris aliquem imbecillum macilētum, qui
multam flauam bilem in sanguine habeat
debes ipsi ea exhibere remedia quæ urinam
multiplicent & non euacuare ipsum, ci-
babisq; eum his quæ optimum sanguinē
generant, ad frigidum & humidū decli-
nantia. Sic enim fortasse temperamētū
humoris eius corriges. Immo forte ro-
borabis ipsum, & tunc euacuationes tolera-
bit. itidem neq; sis præceps in ægro eua-
cuando, qui ex usu habet parum comē-
dere, si euacuacionem euitare potes. Et
qui supra modum obesus, prohibendus
quoq; est ab euacuacione, timentes tñ ne
frigidas præualeat, tum etiā ne caro ve-
nas opprimat, easq; ianitas claudat & suf-
focetur natiuus calor, aut ad uiscera ex-
crementa exprimat. Accidētia quoq; ma-
la ut prōptitudo ad alui profluium (quod
diariam vocant) & conuulsio euacuatio-
nem verant, & etates inferiores integro
incremento & quæ ad terminum vltimi senii
deuenerint.

deuenerint. Tempus quoq; æstiuum & supra modum frigidum, eam non admittunt. Regio ad hæc meridionalis admodum calida satis ei obstat, cū maior pars medicaminum soluentiū sint calida, cōiunctio autem duorum calorum intollerabilis est. Adde etiā q̄ vires sunt imbecilles, & laxę, & calor exterior trahit ad se humorem foras, medicamentū vero intro & sic validus accidet tractus qui ad pugnam ducet. Septentrionalis quoq; regio frigida eadem uetat, & qui parum est assuetus euacuari, ab euacuatione etiam prohibendus est. Itidem et qui habet exercitia in quibus magna fieri solet euacuatio, vt qui balneis subministrant & qui onera ferunt, et tandē in quolibet exercitio laborioso abstinendum est ab euacuatione. Porro scire debes q̄ ex qualibet euacuatione quinq; desiderant. Primum quidem vt id quod euacuari debet euacuetur, postquam prorsus euacuationem alleuiatio subsequatur, nō lassitus

C

TERTIVM

do instrumētorum, aut caloris irritatio
aut feb. diaria. i. ephamera, uel aliquis ali
ius morbus qui subsequi solet, ut intesti
norum abrasio per alui solutionē, & ul
cera uesicę, per urinę euacuationem. nā
etsi id iuuerit, eius iuuamentū nō perci
pietur, immo fortasse statim nocebit, do
nec accidens remoueatur, Secūdo inspi
ciendum est quo tendat, quoniā nausea
uomitu purgatur, & dolor uentris per al
ui deiectionem. Tertio ut origo mēbri
sit in ea parte ad quam uergit, sicut se ha
bet interna uena dextrī brachiī ad ieci
noris affectus, nō autē capitalis dextra q̄
cephalica nūcupatur. Nam si in similis
bus errorem cōmiserit noxam afferret.
Membrum autem per quod educitur, ig
nobilius esse debet eo, a quo uacuatio fit
ne humor ad nobilius tēdat per exitum
q̄ sibi naturalem id fieri debet, ut se ha
bent membra urinaria ad gibbum epatis
& intestina ad eius cōcauū. Præterea mē
brum per quod fit expulsio, quandoq̄ ē
ipsum

ipsummet membrū, a quo euacuatio faci-
cienda est. Sed si in eo fuerit aliquis diu-
turnus affectus, uel aliqua recens ægritu-
do timēdū esset ne humores sup ipsū trā-
sirent, tūc oportebit eos alio' deriuare qđ
sit conuenientius, immo quandoq; uere-
mur ne præ dominio humoris in eo ægri-
tudinem pareat, ut si ab oculo ad guttur
repelletur, fortasse enim in timorem an-
gine nos ducet. Quo circa in similibus
sensim procedendum est, immo ipsa na-
tura quandoq; simili fungitur officio, &
euacuat per insuetam partem, cum custo-
dire curet illud membrum quādo est im-
becille, & aliquādo id quod natura eua-
cuat a remota oppositaq; parte ambigui-
tatem affert, ut si a capite ad aluum aut
crus & plantam pedis, id expellatur. nā
utrum ab uniuerso membro aut ab aliq;
eius sinu id fiat, non vere scitur. Tēpus
euacuationis cōsiderare oportet. et Gal.
adhuc dicit quod in diuturnis morbis
expectanda est concoctio, non in aliis.

TERTIVM

Quid autem sit cōcoctio iam nosti. Post concoctionem autem ante euacuationē exhibenda sunt attenuantia veluti aqua hyssopi, aut satureiæ et semina. Verum in acutis quoq; morbis & præsertim quietis consentaneum est coctionem expectare. Sed si mobiles fuerint, tunc conueniētius est euacuationem materiæ accelerare. Quoniam lesio que ab eius motu prouenit, longe maior est q̃ quæ ab euacuatione ante cōcoctionem, præcipue ubi humores fuerint tenues, & maxime si in capacibus uenarum fuerint, & non ingrediantur membra. At si in aliqua particula humor fuerit detētus, haud quāq; moueatur donec concoctus fuerit, & medium substantiam adeptus, vt ex locis propriis iam nosti. Idem si nō fidamus uirtutem sustentari vsq; ad tempus cōcoctionis, euacuabimus quidem eum humorem, prius tamen cognita eius tenuitate & crassicie. Quod si crassus & dēsus fuerit nequaquā eum moueas, nisi prius ipsum

ipsum

firm attenuaueris. Indicat autem ipsam
crassitudinem nausea quæ præcessit, &
dolor tensius sub precordiis, et ortus a
postematum in uisceribus. Maxime au-
tem animaduertendū est in hac re, ne exi-
gui meatus sint obstructi, et post hæc om-
nia poteris aluum solueŕe ante concoctio-
nem. Quinto vero contemplāda est quā-
titas rei quæ euacuatur, quod quidem ad
considerationem quātitatis materię vir-
tutisq; atq; accidentium quæ post euacu-
ationem remanent attinet. quoniā si ac-
cidens aliquod euacuationem sequatur
minus euacuabimus de eo quod euacua-
re proposuimus, nisi sperauerimus suc-
currere illi accidenti quod euacuationē
subsequitur, vt in conuulsione ex repleti-
one fieri solet. Scias adhuc q̄ dupliciter
materia euacuatur eradicaturq; a suo lo-
co, vel enim per reuulsum ad cōtrariam
remotamq; vel per deriuatum ad contra-
riam proximamq; particulam. Conueni-
entius tamen tempus quod id fieri debet

TERTIVM

est, dum nulla est in corpore repletio neque humorum redundantia ullo pacto. Subiiciatur igitur ut a supremis partibus oris alicuius viri immodice sanguis profluxerit, vel ab hæmorrhoidibus alicuius mulieris, immoderata sanguinis copia effluxerit cogimur omnino aut ad partem vicinam oppositam reducendo, & tunc recte reuocabitur materia, in primo quidem exemplo ad nares, in secundo vero ad locos, mentes reuocando. At si ad remotam partem oppositam reuelleri cupimus, tunc in primo exemplo per infernas. In secundo vero per supernas venas, & corporis particulas sanguinem euacuabimus, & cum ad remotam partem fit auersio, non debet per duas diametros remoueri, sed tantum per unam diametrum quæ longinquior sit. nam si materia in supremis partibus dextri corporis fuerit, nequaquam ad infernas sinistri reuocabis, imo ad eiusdem dextri infernas partes retrahes, quod profecto conuenientius est aut ad sinistras

CAPVT XX

tras supremas, si tāta fuerit distantia, quā
 ta inter flexuram & flexuram, dūmodo
 res non sit ut in duabus capitis partibus
 Nā si in dextra capitis parte materia in
 federit ad infernam, non ad sinistram ca
 pitis partem trahes. Cæterum cum ad lo
 cum remotum materiam reuellere inten
 dis mitiga prius dolorem loci affecti, sic
 enim minor fiet tractionis violentia, cū
 dolor ipse trahat. At cum grauius trahi
 tur ad locum, ad quem trahere cupis nō
 properes importune, fortasse enī huius
 modi vrgens infestatio mouebit materi
 am, eamq; attenuabit & non trahetur im
 mo ad affectum locum facilius reuocabi
 tur. Nonnuncq; præterea satis erit tibi
 retrahere & si eam non euacues, quoniam
 ipsa retractio prohibet materiam cō
 uerti ad membrū, quamuis nō extrahat
 eā. Sola enī auersio ipsa fūgit officio p
 posito, etsi ea nihil euacues, imo sufficiet
 tibi si usus fueris de uictiōe oppositorū

TERTIVM

membrorū cucurbítularumq; defixione
aut medicamentí, quę rubificātia vocāt
& vt sūmatim dicam, quibusvis dolorē
inferentibus remediis. Materiæ rursus
quæ facilius uacuantur sunt, quæ in ue-
nis existunt moxq; in membris, & ar-
tubus. Maxima nanq; cum difficultate
ex his extrahí atq; euacuari possunt, nec
fieri potest quin cum illis aliquid aliud
euacuet. Ad hæc qui euacuatus est nō de-
bet festinare ad cibos multos ac crudos
capiendos, quoniā natura eos incoctos
trahet, q; si aliqua vi cogimur id facere,
id quidem sensim ac paulatim fiat, adeo
vt ordinate res procedat & qđ corpus in-
greditur sit optime concoctum.

Porro uene sectio est humorū eque auc-
torum propria euacuatio. Sed propria
euacuatio, quæ debetur humori sua quā-
titate tantum exuperanti aut sua qualita-
te corrupto, est aliud a uene sectione.

Omnis præterea euacuatio imoderata
solet vt plurimum feb. inducere. Cumq;
ex de

ex detentione alicuius fluxionis confu-
 re, aliquis malus subsequatur affectus, eā-
 dem reuocare euacuationem, curatio vt
 plurimum est ut si aurium sordis aut na-
 rium mucci detētio vertiginem induxe-
 rit, proculdubio eorumeductio eam tol-
 lent. Nec te lateat q̄ minus nocet relinq̄-
 re aliquod residuū humoris, qui euacua-
 tione indiget q̄ exquisitē eum euacua-
 re vel ægrum eo perducere, vt vires debilia-
 renter, quoniam ipsa natura tale residuū
 sepissime soluere solet. Et ubi humor in
 genere perseverauerit cōuenienti, ægro-
 tanq̄ eum bene fert ne timeas exuperati-
 am, & fortasse eris coactus euacua-
 re usq̄ ad animi deliquium. Et si quis vires va-
 lidas habeat, materia tamen humoruū vi-
 cioforum eius admodum exuperans fue-
 rit, uberrime euacuari potest. Sed qui vi-
 res imbecillas habet, humorūq̄ malorū ei-
 us materia multa fuerit, tunc sensim eū
 euacua- oportet. Idem si materia valde
 hereat, aut cum sanguine valde mixta fue-

TERTIVM

rit, is semel euacuari nequit, ut fit in cox-
edice & in articulorum doloribus diu-
turnis & crancro inueterataq; scabie diu-
turnisq; tuberculis. Scias præterea qd al-
ui solutio trahit a partibus superioribus
& eradicat ab inferioribus. Expedit igitur
utriq; tractui conuenienti videlicet &
opposito, conuenit adhuc & post materi-
erū quietem. Et cum materiæ in superio-
ribus partibus fuerint, ad oppositum tra-
hit, & a loco ubi sunt, eas euellit. Vomi-
tus vero et attractionem & euulsionem
opposito modo efficit, venę sectio vero
varie se habet iuxta loci varietatem ubi
sanguis existit, vt iam nosti. Ille præter-
ea minus euacuatione indiget, qui opti-
mo vtitur nutrimento, optimeq; conco-
quit & qui regiones inhabitant calidas.

Caput Quartū fen quartę deregulis quę
vomitui et alui solutioni sunt cōmunes,
deq; modo quo vomitiuū solutiuumq;
trahant.

Siquis



I quis alui solutione vel vomitu
uti desiderat, debet suum dis
partiri cibum, & quantum vno
die sufficit ei, bis idem resumat
varietq; cibaria potionesq;. fiet enim ex
hoc ut ventriculus si quid in se continet
id susq; deq; expellere cupiat. At si cibus
nec varius neq; super alium appositus fu
erit, ventriculus profecto eum tenaciter
retinet, eumq; custodit, vehementerq; eū
amplectitur præsertim si exiguæ fuerit
quãtitatis. Qui vero lenem habet aluum
nullum horum agere debet. Nec te lateat
q; qui bono utitur regimine nō contigit
eum indigere vomitu vel alui solutione
vel aliis similibus. Nam bonū regimen
aliquid aliud his leuius desiderat. Immo
forte si quis diligens fuerit in hac re, suf
ficiet ei deambulatio & frictio & balnea
Qd' si eius corpus repletū fuerit, pfecto
huiusmodi viri repletio, ut plm ex optio
humore erit, hoc est ex sangie huic ergo

QVARTVM

uenę sectio magis necessaria est pro eius
 purgatione non alui solutio. Porro ubi
 necessitas nos cogit uenā incidere, & alu
 um soluere uelut cū ueratro & aliis for
 tibus medicamentis tūc à sanguinis mis
 sione inchoandū est, hoc enim est Hip.
 præceptum in li. de morbis passim gra
 santibus & est profecto uerū. Itidem si
 cū sanguine pituitosi humores imixti fue
 rint, quibus fortasse uenę sectio crassiciē
 & lentorem addiderit, tunc ab alui solu
 tione inchoandum est, & ut summam
 dicam, cū humores æquales fuerint, præ
 pone phlebotomiā deinde euacua. Sed
 si inæquales, euacua prius excrementū
 donec æquētur, deinde uenā incide. Ad
 hæc ubi præponēda est sanguinis missio
 & aliquis pharmacum præmiserit, pau
 cis diebus expectare debet. At cui recens
 uena secta fuerit, & euacuatiōe indigue
 rit, exhibere ei pharmacum conuenien
 tius erit. Multoties uero exhibere phar
 macum, ubi uenę sectio cōueniret, febrē
 una

una cum perturbatione introducit, quæ quidem si adhibitis remediis sedatiuis, non sedetur, tunc nō ignorabis fuisse necessarium præponere sangis missionem. Nec requiritur quelibet euacuatio, ob immoderatam repletionē, immo quandoq; affectus magnitudo repletioq; secundum qualitatem non secundum quantitatem eam exposcit. Sapissime adhuc aliqua necessitas cogit euacuatione uti, & aliquid eam prohibet, nulloq; alio ingenio uti potest q̃ inedia & somno atq; correctione tēperaturæ quam repletio inducit. Cæterū aliqua est euacuatio qua in præcautionē utimur, ut est illa qua indigetis, qui podagra & comitiali morbo, uel aliis corripi certo tempore solet, & præsertim tempore ueris. Tunc ergo ante illud tempus debet se preparare, & euacuatione suæ ægritudini propria uti, siue sanguinis detractio, siue pharmacia, & fortasse administratio exiccantium exterius, & exiccatiua medicamina aliquo

QUARTVM

euacuationis officio fungitur, vt his qui
 aqua inter cutim laborant, administrari
 solent. Nonnūquam pręterea oportet te
 vti medicamento simili in qualitate hu-
 mori euacuādo, ut scamonio cum flauā
 bilem euacuare cogaris. Tunc igitur ei
 admisceri debet id quod sua qualitate ei
 obstat, & ut in solutione conueniat vel
 quod non prohibeat eius solutionem, vt
 sunt mirobalani, malamq; temperaturā
 si quo orta fuerit ab eo, post illud corri-
 gat. Porro qui viscerum seu stomachi ac
 intestinorum appostematibus laborant
 moleste ferunt solutionem & vomitum
 Quod si hoc indigeant da eis lupulos, et
 cartamum, & aquam polipodii, & cassiā
 fistulam et his similia. inquit Hip. Ma-
 cilentos & ad uomitum faciles, purgan-
 dos esse per vomitum, hoc aut fiat estate
 vere, autūno, non hyeme. Sed qui me-
 diocriter carnosus fuerit, conuenienti-
 us est eum per inferiora purgare. Quod
 si res vrgeat vt vomitu euacuemus, ad
 estatē

estatem differe debemus. Cauendumq̃ ē
ab eo, nisi ubi magna urgeat necessitas.
Attenuatio præterea humoris quē eua-
cuā volumus, solutioni ac vomitui præ-
ponenda est. Itidem et meatū dilatio re-
clusioq̃. hoc enī fidimus, corpus nullū
laborem esse passurum. Cæterū scire de-
bes q̃ assuescere naturam, vt reddatur le-
nis & facilis, ad id quod cupis videlicet
ad ventris solutionem, vel vomitū, ante
q̃ exhibeatur solutiū, vel vomitiū,
est regimē p̃speṛ. Ad hæc vētris pruga-
tio atq̃ vomitus, vbi gracilitas ventris
absit, difficilis quidem ac laboriosa & pi-
culosa. Porro vomitum medicamen-
tum efficitur solutiū, cum ventricu-
lus validam habuerit vim, aut vbi post
vehementē famē exhibitum fuerit, vel si
ille cui exhibitū ē solutus sit, vel natura
lenis, aut ad vomitū insuetus, aut q̃ illud
medicamētū sit grauis subst̃antię, facile d̃-
scēdēs. Solutiū vero reddiū vomitiū
ob stomachi ibecillitatē, aut imo deratā.

Excrementi alui siccationē, aut quia me-
dicamentum id abominabile est, aut qui
illud sumpserit nauseam patiatur. Cūq;
aliquod solutiuum medicamentū nihil
vel aliquid incoctum soluerit, humorem
soluendū mouet & eum p corpus disper-
git, corporiq; dominatur, & alii humo-
res in eum cōuertūtur, & talis humor in
corpore multiplicat. Est prēterea in cor-
pore aliquis humor qui facile uomitui
cōsentit, ut plurimū, sicut flaua bilis, ali-
quis uero cum difficultate ut atra bilis,
quidam utrūq; habet ut pituita. Ad hæc
febriens alui purgatione potius q̃ uomi-
tu uti debet, qui aut humorē habet deor-
sum descendētem, ut qui lenitate intesti-
norū, quam lyenteriam dicunt, laborat,
prohibitus est enim vomitus. Porro in-
ter cætera medicamina soluēntia illud
certe deterius est, quod tempore solutio-
nis ex medicamētis maxime diuersis cō-
stat. Quoniā solutio perturbatur, et pri-
mum antequam secundū soluet, & forte
primum

primum substantiā secundi soluet. Quicunq; præterea solutioni alui uel uomitus se cōmittit cum purū habeat corpus, impossibile est, quin & capitis uertiginē, uentrisq; tormina atq; inquietudinē patiatur, & quicquid euacuabitur ab eo, id prorsus maxima cum difficultate purgabitur, & ut unico verbo dicam, quocienscunq; solutium medicamentū excrementa expurgat, nullam consequitur ipsum perturbatio. Sed cū incoeperit perturbatio, id profecto aliquid aliud q̃ excrementum euacuat. Cumq; humor qui per uomitum uel aluū euacuādus est, in alium conuertatur humorem, corpus profecto indicat esse expurgatū ex illo humore, quē euacuare desideramus. Sed si in abrasionem, & quid nigrū fetidum uertatur, tunc malo est. Præterea ubi somnus post solutionem inualuerit, significat corpus esse exacte purgatum per talē euacuationem, & contulisse. Nec te lateat q̃ si post solutionem uel uomitum, sitis inualues

QVARTVM

rit, q̄ perfectam ac exquisitam optimā q̄
 purgationem significat. Scias adhuc q̄
 solutium medicamē soluit uī tractiua,
 qua ipsummet humorem trahit, & fortas
 se trahit crassum humorem & tenuem re
 linquit, ut quod atrambilē soluit effice
 re solet. nec recte locutus est qui dixit il
 lud medicamen generare id quod trahit
 vel q̄ tenuius primo trahat. Tametsi Ga
 lie. sententia hæc sit, absolute taman. d.
 q̄ illud solutium, quod nullā habet be
 neficam uim si non soluerit, sed in nutri
 mentum cōuertatur q̄ generat humorē
 quem trahit, sed hæc sententia nō est om
 nino probanda. Verum ut ex sententia
 Gal. colligi potest uidetur ipse censere,
 q̄ inter medicamentū trahens, & humo
 rem tractum sit quēdā similitudo in sub
 stantia, & ideo trahit, quæ quidem sentē
 tia non uidetur ueritatī conformis. Nā
 si tractio fieret per similitudinem, ferrū
 certe ferrum traheret quando illi domi
 naretur, & aurū itidem aurum attraheret,
 ubi

ubi sua quantitate illi præualeret. Verūta-
 men huius inquisitionis finis, ad alium
 quā ad medicum pertinet. Secundū ad
 huc est q̄ attractio humorum, quæ fit p̄
 potionem solutiui medicamini vel vo-
 mitiui, per easdē fit uias, p̄ quas pulsi fue-
 runt donec ad intestina & ventriculum
 perueniant, ibiq̄ natura mouet vt foras
 propellat. Raro tamen accidit ut perpo-
 tionem solutiua ascendat ad stomachū
 quod si ascenderint aduomitū quidem
 euocabuntur, duabusq̄ rationibus non
 fit ascensus ad stomachum. Prima quia
 solutiuum medicamentum cito penetrat
 ad intestina. Secunda vero quia tempore
 potionis pharmaci solutiui natura festi-
 nat expellere ex uenis mesaraicis nūcu-
 patis, deorsum non sursum. Est enim id
 & propinquius atque facilius. Adde
 etiā q̄ subsequētia, ea quæ præcesserūt im-
 pellūt. hoc autē maxime mouet naturā ad
 expulsionē p̄ propinuiorē uia et si medi-
 camē haberet uim tractivā nō cōiunctā.

Dij.

QVARTVM

ipſi humori, tunc uis naturæ expultricis deberet magis præualere in corpore ſano ac robuſto. Accedit ad hoc quia medica-
men trahit illum ad propriam uiam. At
uomitium medicamen cōtrario modo
ſe habet, nam cum in uentriculo eſt inibi
moratur & humorē trahit ad ſe ex iſteſti-
nis, ſuaq; ui & reſiſtentia naturali uirtus
ti dominatur. Scire adhuc debes q̃ mai-
or attractio humorum, quæ fit per medi-
camentorum ſolutiuorū tractum, eſt in
uenis, niſi ualde uicinum extiterit, tunc
enim ex eo & in uenas et non uenas hu-
mor trahitur ut in humoribus qui in pul-
mone ſunt fieri ſolet, hi enim per vicini-
orem uiam trahuntur ad uentriculum et
intestina, quamuis non permeant per ue-
nas. Item ſcias q̃ ſæpiſſime exiccatio que
fit cum medicamētis exiccātibus, eſt cau-
ſa euacuationis humiditatum, a corporē
ut in aqua inter cutem fieri ſolet.

Caput Quintū ſen quartæ ſermo de pur-
gatione & eius regulis. Iam



Am ante a nobis traditum est
oportere corpus preparare ad
recipiendum solutiũ medica-
men, anteq̃ exhibeatur ampli-
ficatione meatuũ lenitio, neq̃alui & pre-
sertim in frigidis affectibus, & vt sumas-
tim dicam, ante ventris solutionẽ lubri-
cum facere est optima regula, in qua ma-
xima fiducia habenda est præter q̃ in his
qui admodum parati sunt ad alui fluxũ.
In his enim nihil tale agendum est. quo-
niam imodici profluvii periculum esset.
Horum ergo solutio medicamine ad-
miscendum est aliquod vomitiuũ, ne fe-
stinet descendere a ventriculo anteq̃ p-
ficiat officium suũ. Immo equetur in eo
uis vtriusq̃ medicaminis, & solutiũ as-
gat suam actionem, vomitiuũq̃ suo fun-
gatur officio illi opposito. Cæterum bal-
butientes sunt fluxui ventris expositissi-
mi, ideoq̃ fortissimũ medicamen soluti-
uũ non ferunt, & vt plurimuũ eorum so-
lutio provenit ex fluxionibus capitis, p-

QVINTVM

iculosum præterea est sumere pharmacū
 solutiūum manētibus siccis excremētis
 in intestīnis, sed debent prius educi siue
 clysteri siue aliquo lenitiuo iure, uti etiā
 balneo ante solutiui pharmaci potionē
 per aliquot dies, ē ex præparatiuis reme-
 mediis præsentaneis, nisi aliquid īpedi-
 erit. Sed inter balnea & pharmaci potio-
 nē exiguū debet interesse interuallū nec
 post pharmaci haustum debet balneū in-
 gredi, quoniā materiā ad exteriora euo-
 cat. Conueniret tamen ubi alui fluxionē
 sistere curaremus. Sed hyeme nihil incō-
 uenit primam domū balnei ingredi, ubi
 eius calor haud quaquā possit trahere, sed
 lenire, & ut verbo dicam, aer ubi uersa-
 tur qui pharmacū sumpserit ad exiguā
 caliditatē declinare debet, ne sudet neq;
 molestia afficiatur. hoc enim inter ea q̄
 præparant numeratur. Itidē & frictio &
 inunctio ex oleo præparatiuum est re-
 mediū. Atqui pharmaco non fuerit
 usus, neq; ipsum potauerit, nequaquam
debet

debet medicus exhibere ei medicamina
vehementer soluentia.

Qui vero repletione, tenentur humoribusque
glutinosi ac tentione in praecordiis labo-
rant, & qui in uisceribus inflammatione,
& opilationes habuerint, nulla est eis ex-
hibenda potio donec id lenientibus alia-
mentis, balneo ocioque & dimissione re-
rum quae moueant & inflamment corri-
gatur. Porro qui aquas stagnales bibunt
ac lyenosi fortia desiderant pharmaca.

Adhuc si quis ualidum hauserit pharma-
cum satius erit post illud dormire antea
quam operetur, quoniam tunc melius suo
fungetur officio. Si vero debile id fue-
rit, satius erit a sumpto pharmaco non
dormire, quoniam natura medicamen-
tum id concoquet. Sed cum pharma-
cum incipit operari utcumque fuerit, tu-
tius est non superdormire neque debet
moueri super potionem pharmaci, sed qui
escere ut ipsum natura amplectatur agatque in

Diiiij

QVINTVM

ipsum, nam nisi in ipsum agat id in naturam non aget. Oderare tamen debet quā nauseam prohibēt ut mentā & rutam et apium & citoniū et terram lenniā rosacea aqua respersam, pauco addito aceto & si ob odorem pharmaci rēnuat illud haurire, claudat nares. Debet paterea qui a medicamēto abhorret aliquid taracōn (quod pyrethrū a nōnullis esse creditur) mādere ut oris facultatem stupidam reddat. Quod si vereatur ne medicamētum euomat, extrema deligere debet, & post potum statim aliquid habens astringendi vim sumat. Cæterum his quādoque medici catapotia melle obuoluūt, nōnunquam melle Zuccharo, decoctis, adeo ut indumento quodam oblinantur. Est quoque cōueniens industria ea cera liniri. Ex industria adhuc est implere os aqua, vel aliquo alio, deinde catapotia ut sūt deuorare, aut aliqua alia industria uti totūque id ita deglutiat, ne a medicamine quis afficiatur. Decoctum aut debet tepidum potari.

tari. Catapotia vero cum aqua tepida de glutire licet. Ad hæc qui pharmacū haurit ventriculū atq; pedum plantas calefacere debet, & statim ipsū sumere. Sed postquam animus quieuerit ambulet, ac sensim moueat, quoniā huiusmodi motus satis iuuat, paulatimq; aquam calidā hauriat quantitatem tamen qua nec medicamentū soluat neq; ipsum educat eiusq; vim hebetet nisi ubi urgeat necessitas fluxionem alui detinendę. Potu adhuc aquæ calidę euitamus lesionem pharmaci. Præterea qui calidi temperamenti est debilisq; constitutionis & imbecillis ventricule et uult pharmacum sumere debet antea bibere quale est aqua ordeï vel vinum granatorum, & vt summatim dicā, aliquod alimentū tenue facilis cōcoctionis ventriculo præponat. At si non ita se habuerit satius est vt ieiunus pharmacum hauriat. Porro qui estate soluit in feb. incurrit. Et qui pharmacū sūpsit nō debet comdere neq; bibere donec phar

Dv

QVINTVM

macum suum perficiet officiū, neq; post
 eius solutionem dormire licet, nisi flux
 um sistere uolet. Et si eius ventricu
 lus non sustinuerit inedia, eo quod bi
 liosus sit, facileq; ad eum bilis confluat,
 aut quia iam diu præcautione inedia us
 sus fuerit, tū debet exhiberi ei panis pau
 co uino maceratus, post pharmacum, an
 te purgationem, hoc enim fortasse adius
 uabit pharmacum. Nec anum aqua fri
 gida, sed calida abluere debet. Quidam
 dixerunt quod catapotia deuoranda sūt
 cum aliquo decocto eorum nature respō
 dente ueluti catapotia que flauā purgant
 bilem deuoranda sunt cum decocto fuz
 miterræ, & quæ atram cum decocto epi
 thymi & filiculi & id genus aliis, & quæ
 pituitam educunt cum decocto centauri
 Cæterum cum aliquod corpus siccum
 duram habens carnem aliquo forti me
 dicamine euacuare uolueris, ut ueratro
 & id genus aliis, ualida humectatione
 prius utendum est, cibis scilicet pingui
 bus

bus. Tandem fortia medicamenta purgatiua magnum minitantur periculum ut est ueratrū corpori. namq; integro cōuulsionem adfert. plethorici uero corporis humores motu periculoso cōmouet & simul ad intestina trahit quod nausēam excitat. Cumq; maximum infertur nocumentum ex potu alicuius lactarię herbe uenenosi generis, quę tithymallia vocantur, ut est daphnoides, quam laureolam uocamus, vel pityusa, quā scebrā mauri appellant, id nocumentū lacacetosum tollit astringitq;. Sæpiissime præterea mediacamen dimittit odorē in uētriculo, ita uideatur ipsummet inibi remansisse, cui remedio quidem est farina ordeī tosta, ob eius deterسیونē. nihil enī in omnia q̄ bibunt melius est. Cūq; iam diu pharmacū sūptum fuerit, nec dū opari cœperit, tū si fieri pōt ut ipsū euomat et nihil moueat fiat. Sed si aliquid obster fatius erit traicere aquam mulsam vel eius sy. aut aquā in qua nitrū sit dissolutū vel glandē supponat aut clystrē ifundat

QVINTVM

Causę autem impotentię pharmaci sunt
vel meatuū angustia a sua formatiōe aut
ob temperaturam, aut ex morbi vicinita
te, nam qui resolutione quam paraly sim
uocant, & stupore attonito quę apople
xiam dicunt capiuntur, astrictos habent
meatus, quibus medicamina debent trās
sire ad illorum humores, & ideo illorum
solutio imbecillior redditur. Porro duo
medicamenta solutiua eodem die porri
gere vt metu plenū est ita alienum a rati
one. Quodcūq; etiā pharmacū quod
est propriū alicui humori, si eum non
inuenerit perturbabit quidē, & cum dif
ficultate soluet idemq; efficiet si eū in
suo contrario imersum inuenerit. Cate
rum omne pharmacū soluit primo hus
morem sibi propriū, deinde eum qui ma
gis exuperat tenuiorq; est. Itidem & reli
quos iuxta hūc ordinem præter sangui
nē, quem quidem natura post ponit atq;
custodit. Attrahere præterea humorem
distantem difficile est, adhuc si quis vere
atur

atur ne a pharmaco hausto superueniat
ei inquietudo & nausea, is quidem duo-
bus aut tribus diebus ante pharmaci usū
debet vomitum citare cum decocto radi-
culę, eiusq; esu neq; salis copia inedulius
uti debet qui purgationē desiderat. Cate-
rum sæpissime cum pharmacū nō soluit
molestiam nausēā animi deliquium, tre-
morem cordis torminaq; adfert aut su-
dorem, sæpiusq; coguntur ipsum euome-
re. Quandoq; tamen sufficit sumere quę
habent vim astringendi. Potus quoq;
aquę ordeī tollit eius lēSIONem, detergit
q; quicquid intestinis adheret, & qui fri-
gidę est tēperature, cuius humoribus pi-
tuita præualet post pharmaci assumptio-
nem eiusq; operationē sumere debet na-
sturtium aqua calida elotum cū oleo, at
si calidi fuerit tēperamēti, sumat psylliū
ex aqua frigida & oleo violaceo et zucch-
aro albissimo & Iulep. Sed qui modera-
tam habet temperaturam sumat semen li-
ni, & qui abrasionē intestinorum timet

QVINTVM

armenię glebam, quam lutum armenum
 uocant, ex vino granatorũ sumat. Porro
 his enarratis a purgatione utendũ est
 ni eam sistere velis. Cæterũ si febris quę
 piam a pharmaci potione inuadit, nihil
 melius aqua ordeacea. Syrupus vero
 acetosus intestina deradit, postponi ergo
 debet, in secundũ aut tertiũ diem donec
 intestina sibi restituta fuerint. Porro qui
 purgatus est balnea debet ingredi die se-
 cunda, quoniam si quid relictũ fuerit ex
 humoribus, id balnea dissoluunt. Quod
 si balneis oblectetur ac in deliciis habe-
 at, indicio est q̃ eum a residuo purgabũt
 itaq; sine eum. Quod si scias eum nõ ob-
 lectari illis sed potius molestari tũ illinc
 eum auoces. Nec te lateat q̃ qui ventricu-
 lum & intestina imbecilla habet, fortas-
 se ab ipsis medicaminibus quibus uis
 purgandi inest, facultatem solutiuiam
 adipiscetur, talisq; affectus in eo perdura-
 bit, ita vt multis remediis indigeat quo
 astringatur. In senibus quoq; metuendũ
 est

est de solutiuo & eius nocumentis. Præ
terea sciēdum est q̄ bibere aqua fructuū
post medicamina purgatiua febres per-
turbationemq̄ inducit. Multoties etiam
post purgationem venęq̄ sectionem re-
manet dolor in epate, quem potus aquæ
calide tollit. In ortu etiam canis, atq̄ in
frigoribus maximis non est purgationi-
bus vtendum, idcirco satius est vere vel
autūno pharmacum sumere, autumnus
tamen ei rei aptior est. Hyems autem est
tempus, quo nix in mōtes cadit, Ver autē
ęstas subsequitur. Ideoq̄ non sumatur
in eo nisi quod tenue, sed autumnus est
equale tempus. Semper autem non est af-
fuescenda natura ad pharmaca quoties
īdiget lenitiōe, quoniam id in usum cō-
uerteretur, & eius tandem exitus ad per-
niciem ducet. Pharmacū q̄q̄ fortes vires
dissoluit eiusq̄ temperamētū habet siccū
post potionē autē debilis pharmaci parū
mouēdū ē ne eius vis dissoluat. In ē medi-
camēta debilia benedicta, numerādę sūt

QVINTVM

violę & zuccharum, & qui hyeme soluti
uo medicamento indiget, uentum obser
uet austrinum, æstate vero septentriona
lem. Aliqui tamen huius contrariū aiūt
Sed id quidem distinguere oportet iux
ta varios morbos. Cumq; eger debilis in
digerit solutiuo pharmaco, & nihil il
lud operet, nequaquā debet is moueri sed
dimittendus est. Multoties præerea ven
tris solutio morbū excitat, febremq; pa
rit cui rei fortasse venę sectio sat erit.

Caput Sextum quaræ fen, de immodica
alui purgatione & quando retinenda sit



Nter indicia quibus cognosci
mus iam accedere tempus, quo
alui purgatio sistenda sit, est si
tis. Quod si purgatio perseue
ret & sitis non euenerit nō est cur timeas
eum modum excedere. At sitis nōnunq;
accidit non propter multam & immode
ratam purgationem, sed propter ipsum
uentriculū

uētriculum. nam si calidus uel siccus fue-
rit uel utrūq; horum habuerit citissime si-
tiet. Itidem propter ipsum pharmacū id
fiet, ut si fuerit calidum exustiū. Itidem
& ob ipsummet humorem si biliosus fu-
erit, ut flaua bilis, prop̄t huiusmodi ergo
causas non mirum si sitis acceleret. Quē
admodum si contrarię his causę contin-
gant nihil a ratione alienum erit ipsam
sitim tardius se offerre. At cum sitim im-
moderatam purgationēq; non modicam
uideris, tum omnino reprime eā, præfer-
tim si nulla causarū uelocis ac citę sitis
adfuerit. In hmōi enim cum sitis appare-
at, haud quāq; differendum est. Et forte
id quod expurgabitur, tempus quo pur-
gatio abscindēda sit tibi indicabit. nam
ubi ex flauę bilis purgatio iam purgati-
onem deuenisse ad pituitam perspicuū
fuerit, tunc excessū fecisse notabis. Mas-
xime uero si ad atrę bilis purgationē res
peruenerit. Sanguinis autem soluti mas-
ximi periculi maximiq; momēti est. Cæs

E

SEPTIMVM

terum si alicui tormina in ventre relicta fuerint recurrendū est ad id qđ in tractatione de torminibus dictum est.

Caput Septimum fen quartæ, Quonam pacto corrigendus sit affectus illius cuius purgatio modū excessit.



Purgatio quidem redditur immodica, uel ob uenarum imbecillitatem, aut qđ earum ora reserata sint, vel ppter ea qđ purgatiuum pharmacū ora earū mordet vel quia corpus ex eo malā acquisiuit tēperaturam, et sic de aliis id genus. Si igitur alui purgatio immodica fuerit, tū sursū & deorsum extrēa diligenda sunt incipiendo ab ascellis & inguinibus, et descendendo inferius ab eis, exhibendum qđ est parū medicamēti quod ex uiperis cōstat theriacam uocant, & philonium, et sudorem prouoca si fieri potest siue balneo siue uapore aquæ calidæ sub eius pannis e quibus

quibus caput extollat, & si sudor ad modum exuperauerit, ppina ei quæ stipât. Detergantur autem aut fricentur rebus astrictiuam uim habētibus, adhibeantur q̃ ex aquis odoratae madefactiōes, ut sūt infusiones odoratae & sandali & cāphora & succus fructuum, partesq; exteriores fricare atq; calefacere oportet. Immo si opus sit cucurbitule ignitę cū scalpellatione sub costis ac inter humeros adhibende, & si necessum fuerit emplastrum ex farina ordeī tosti, ac astringentes aq̃s uentriculo & uisceribus super inponas. Itidem & olea astringētia ut melinum et mastichinum. Aer quoq; frigidus euitā dus ē, cōprimit enim ac aluū soluit, a calido etiā āere abstinendum, quia uires exoluit & odorem fragrantibus hi confortandi sunt, stypticaq; deglutiant, panem quoq; exiccatum, quem arabes chahchah, nos biscoctum uocamus uino arematico deuorent, sitq; tale calidū & quod iam antea sumpserit panem

SEPTIMVM

ex uino granatorum & genera cibarioꝝ
ex farina ordeï torrefacti, cōfectorum, et
cortices papaueris cōtritas. Experientia
quoq; cōprobatū est summopere uale-
re semen nasturtii trium drachmarū pō-
dere, quod prius torrefiat, mox lacte ace-
toso subagitata. Dog ab arabibus dicto
coquatur, donec coagulet, deinde potu
detur. Cibus præterea debet uim astrin-
gēdi habere & niue refrigerari uelut est
uinum, succus uuarum acerbis & id
genus alia. Ad retinēdas etiā alui fluxio-
nes multum ualet uomitum aqua calida
excitare, extremaq; in ea ponē. Quod si
gratia exempli animi deliquio corripiā-
propina eis uinū, & si id totū nihil pro-
derit, tandē poteris uti his quæ uim ob-
tinent soporificā, & quæ sunt ualentissi-
ma remedia in tractatione de sistenda al-
uo cognita. Medicus adhuc debet apud
se paratos tum pastillos ac pulueres strin-
gentes deglutiendos, tum etiam clyste-
res ac eorum instrumenta.

Caput

Caput Octauū quartæ fen. Siquis phar-
macū solutiū sumpserit & nō soluerit.



Vm purgatiū medicamentū
nō purgauerit, torminaq; ac in-
quietudinē capitisq; dolorē
uertiginē pādiculationes, of-
fensionē uentris, recurrēdum ē ad
clysterem ac glandes notas, bibatq; e ma-
stiche tres drachmas ex aqua tepida, &
fortasse iuuabit pharmaci operationem
astringentiū potus, uesciq; postea cito-
niis ac malis ut quæ & os uētriculi & qd'
infra est cōprimere ualeant, nauſeamq; si
stant, & purgatiui pharmaci motum qui
sursum fertur deorsum reuocent, naturā
q; roborēt. At si nihil clyster iuuerit, ma-
laq; accidētia orta fuerint ut corporis tē-
tio, oculi præeminētia, motus quoq; supe-
riora petat, tunc haud quāq; poteris ue-
næ sectionem euitare. Quod si nec phar-
macum purgationē fecerit maliq; casus
subsecuti fuerint, incidere quoq; uenā

E iij

NONVM

postea par ē imo etiā post duos aut tres
dies, nam nisi id fiat timendū erit ne hu-
mores ad aliquas principes partes se con-
uertant.

Caput nonū fen quartæ, De medicamen-
tis quibus purgandi uis inest.



Vædam sunt solutiua medica-
mina quæ admodū uiciosa sūt
ut helleborus et genus tripoli
(quod turbīt vocant) præfertī
quod vitiosum est et genere croceum, iti-
dem & agaricum non album neq; purū
sed ad nigredinem decliue, & sicut daph-
noides (laureolam dicunt,) hæc enim vi-
tiosa sunt, et si qd' horum sumatur, mala
inde sequuntur accidentia, consentaneū
igitur est a corpore quantū possibile fue-
rit, vomitu aut aluo expelli, & medicas-
mentum quod ex viperis constat (theria-
cem vocant) remedio exhiberi, & multo
tiens potio aquæ frigidæ, sedereq; in ea
phar

pharmací malítiam pellít, vetatq; anhelítum ab eo corrumpí, q̃ omnia ex turbít citrino et putrido ínferri solét, ad idem valet quícquid acredínem sua glutinositate & leníficatione atq; pinguedine ínfríngít, nōnūq; præterea adest quædã proportío inter medicamēta et quædam singulária temperamenta ut scamoniũ quod quídē ín his quí ín regionibus degunt frígídis, nísi ín magna quãtítate sumatur exíguam effícít operationē, ut ín regione germanorum. Cæterum ín aliquibus corporibus atq; regionibus fortasse non oportebít substantíam medicamētorum exhibere, sed eorum vírútē. Porro medicamentis purgatiuis conueníens est adhiberí medicamenta odora, ut per hæc mēbrorum víres seruētur, ad quod negotíum medicamento cordíalía optíme valent, cum vítalem spírítum ín omni mēbro confortent & maior pars horum sua tenuítate & penetratíone ad id cōferunt, & quãdoq; cōiunguntur duo

NONVM

medicamēta, quorū alterū cito, alterū ue-
 ro tarde purgat suū humorē, primumq;
 cū suam cōpleuerit operationē, iam secū-
 dum ad suū humorem uī quadam impu-
 lit, ac in ipsū egit, & eius uim hebetauit
 adeo ut cum secundum postea suū agit
 opus, obtusi plane uigoris sit mouens &
 non perficiens. Admiscendum igitur est
 illi aliquid quod eius uim incitet, festina-
 req; illud faciat ut zinziber mixta triopo-
 lio (turbīt uocant) efficere solet. nō finit
 enim illud longo torpere tempore. itidē
 efficit si ea exacte cōmisceas. Cōtempla-
 ri autē debes eas regulas quas de uiribus
 medicaminum simpliciū uim purgatiuā
 habentium exposuimus, ubi de uniuersa
 libus regulis simpliciū medicamento-
 rum sermonem egimus. Medicamen ad
 huc purgatiuū quandoq; sua proprietate
 digerēdo ut turbīt, quandoq; cōprimen-
 do soluit ut myrobalanus, nōnūq; tamē
 lenitiōe, ut genus æerei mellis (qd' arabes
 siraco st uocant) quandoq; lubrica opa-
 tiōe

tionē soluit, ut succus pulicaris herbæ q̄
psyllion uocatur & prūa. Maior autem
pars pharmacorum fortium habet, quod
uenenose facultatis et purgat, donec uim
inferat naturę, ideo corrigi debent iis
quæ pellendī uenena facultatem habent
q̄ theriacalia remedia uocant. Nōnunq̄
uero amaritudo acredo astrictio, acrimo
niæq̄ medicamenti (quam pōticitatem
appellant) atq̄ eius acetositas actionem
pharmaci adiuuant, præsertim si cū eius
proprietas cōueniant. nam amaritudo
& acredo ad digestionem, acrimonia ue
ro ad expressionē, & acetosa facultas ad
incisionem, q̄ ad lubricum reddendū pre
parat. Nec debent simul coniungi cum
cōpressiuis q̄ lubricent æquis portioni
bus, ita ut eorum uires inter se æquales
sint, imo aliud alio tardius operari debet
ita ut grā exēpli illud medicamē agat suā
opationē anteq̄ expressiuū, mox expres
siuū supueniat & purget qd' lenitiuū le
niuit, & seruata hac rāōe i reliqs idē fiat.

DECIMVM

Caput Decimum fen quartæ, Quidnam
hac de re alibi querendum sit.

IN cōmentario nostro de medi-
camentorū cōpositione (quem
acrabadin inscripsimus) querē-
da sunt medicamenta tum purgatiua tū
etiam lenitiua, siue epota siue inuncta &
id genus alia ac illorum ætates in tracta-
tione uero de simpliciū medicaminū ma-
teria, querēda est correctio cuiuslibet sim-
plicis medicamenti & quo pacto eius de-
fectui succurrendum sit ac qualiter po-
tu exhibendum sit. Catapotia quoq; an-
teq; lapidis duritiem siccitate contrahāt
deuorari debent. Neq; ea dum recentia
molliaq; sunt ita ut hæreāt & lēto-
re suo conglutinentur deglutire licet, sed cum
desiccari incipient et digitis cedunt,

Caput Vndecimū fen quartæ, De vo-
mitu.

Qui



Vi propter suam naturā minus ad vomitū duci debent, sunt quidem omnes qui angustum thoracē, viciōsamq; respirationē habent, sanguineoq; scretui parati, et quicūq; collū obtinent gracile et quorū guttur abscessibus facile corripitur, ventriculūq; imbecillum habent atq; admodum obesi, his enim alui purgatio debetur. Macilentis vero vomitus magis conuenit ob eorum biliosam naturam. Qui vero ob cōsuetudinem vomitum euitā debēt, sunt quotquot vomitum moleste ferunt vel insueti, nam si validis vomitiuis medicamentis ii euomuerint ocissime venæ membrorum respirationis scindentur, et in phthisim corruent. At si res fuerit ambigua, fiat periculum leuibus vomitiuis et si facile fert, poterit deinceps fortioribus uti velut veratro et id genus aliis.

Verum si aliquis cui vomitus plene prohibetur ipsum euitare non possit is præparandus & ad consuetudinem

VNDECIMVM

ducendus est, alimenta lenia atq; pinguia
& fluida ei exhibenda sunt, & a deambu-
lationibus quiescere debet, & postea vo-
mitus fiat, pinguiacq; ac oleaginosa cum
vino bibat, & ante uomitū optima edua-
lia comedat, præsertim si cum difficulta-
te euomat, nam fortasse non euomet, na-
tura id recusante quod quidem melius ē
bono q̃ malo cibo adhibito, cūq; post ci-
bum quē pro uomitu futuro assumpsit
euomuerit comedere differat, donec fa-
mes increuerit sitimq; mitiget, uelut cū
syrupo de pomis sine aqua et absq; iulep-
et syrupo acetoso, hæc enim nausēā in-
citant, cibis quoq; qui ei debetur est pul-
lus gallinaceus preparatus cum iusculo
(quod arabes adrabagi nominant) & po-
stea bibat tres cyathos. Quicūq; aut acie-
da præter cōsuetudinē euomuerit, in pul-
su quoq; aliquid febris apparuerit differ-
re debet cibum usq; ad meridiē, antea ta-
men aquam rosaceam calidam bibat, qui
uero atrā bilem euomuerit, spongia ace-
to

to calido madefacta, uentriculo superpo-
nenda est. Cibus præterea eius qui uomi-
tum facere decreuit debet esse uarius, quæ-
niam si unicus tantum fuerit cibus, fors-
tasse uentriculus eum amplectetur & re-
cusabit reddere, post uomitum adhuc hu-
meatatiuum satius erit comedere auuncu-
lus & columborum pullos uolantium, non
tamen ossa extremorum eorum, grauiora
enim sunt, ac tarde ea uentriculus conco-
quit. Ad balneas quoque se transferre debet
Cumque uomitiuum medicamentum biberint
currere ac deambulare laborare uel debet
mox euomant idque in meridie. Ante ue-
sto uomitum debet oculos linamentis ad-
hibitis ligari, uentremque ualde leniter fascia
obuoluere. Et quæ ad uomitum parant sunt
eruca radícula quæ estur & edulium ex pasta
confectum, quod itria uocatur, & origanum
montanum recens et cepa & porrum &
aqua ordeï cum suo sedimento et melle
et edulium ex faba confracta confectum
uinumque dulce, amigdalæ quoque ex melle

VNDECIMVM

& id genus alia, et repletio ex pane azim
mo oleo præparato, et melones, & cucu-
meres, eorumq; semina aut aliquid ex eo-
rum radicibus aqua maceratis contusis,
et suo modo dulcoratis, itidem et hermo-
dactylus. Ille autem qui vinum ut euo-
mat hiberit, non debet post paucam eius
q̃títatem sed post multam id facere. Zy-
thus quoq; (quod phoca arabes vocant)
si ex melle post ballnea bibatur, vomitū
atq; aluū mouebit. Ad hæc vomiturus
non debet ante vomitū fortiter mandere
quæ comedit. Cæterum qui validū medi-
camentum vomitiuū bibere cupit vt ve-
raturum illud ieiunus bibat, nisi aliquid
obstet transactis duabus horis diei, red-
dito prius alui excremento, quod si pēna
vomuerit bene est, si uero aliquātis per-
laboret & si id satis non sit balneū ingre-
diatur, & pēna qua vomitū irritat debet
oleo cyperi (arabes alcānam dicunt) per-
ungi et si exagitatio atq; molestia infera-
tur, bibat aquam calidam et oleū oliuæ
siue

siue soluat siue non. Ad id quoq; condu-
cit calefacere uētriculū & extremas ptes
nauseam enim inducit. Cūq; uomitiū
medicamentum iusto citius operari cœ-
perit qui euomit quiescere debet, optima
q; odoramēta olfacere extrema q; mades-
facere, & aliquid aceti bibere, & mala at-
q; citronia cū pauco mastiche sumat. Nec
te lateat motum magis, quietem uero mi-
nus vomitum inducere. æstas præterea
ad vomitū tempus est maxime accōmo-
datum, proinde si quis corporis natura-
lem habitū ad uomitū minime propensū
habeat, eo tamen indiget æstate tutius ei
cōceditur. Remotior quoq; terminus a
quo uomitus fit, quoad primā expurga-
tionem est ventriculus etiā sine intesti-
nis. Sed quoad secundam purgationē
fit a capite & reliquis partibus corporis
Attractio uero & exquisita eradicatio
ab inferis fit partibus. Vtilem autem
vomitum ab inutili discernes si eum
alleuatio excipiat & optima appetentia

VNDECIMVM

atq; respiratio, pulsus optimus, itidem et
 alię uirtutes respondeant, & quod a nau
 sea initiũ sumpsit. Solet autem magis uo
 mitus offendere, quem uentriculi mor
 sus uehemēs comitat̃ & exustio, si medi
 camentum fuerit ualidum, ut ueratrũ qđ
 cum sumitur, incipit primo effluere saliz
 ua, deinde subsequetur eā uomitus mul
 tepituitę & excretiones, postea uomitus
 fluens ut sputũ, morsus autem atque do
 lor manent, neque in alios casus permu
 tantur, præter ipsam nauseam & eius
 molestiam, fortasse tamem uenter solue
 tur, mox hora quarta incipiet quiescere,
 & ad requiem vergere. Vitiosum autem
 illud est, ubi uomitus nō paret, molestia
 q; augeatur, tentio quoq; ac oculorum
 prominentia, & eorum uehemens rubor
 sudor exuperans uox intercepta, nam si
 quis his afficiatur & non succurratur ei
 ad interitum deueniet. Corrigitur autē
 id clysteri & potu aquę mulsę atq; tæ
 pidæ aquæ, & oleorũ antidoti uim obti
 nentiũ

obtinentium ut est oleum de lilio, & con-
netur ut uomitus prouocetur, quoniam
si euomuerit non suffocabitur, ad clyste-
rem autem apud te præparatum conuer-
ti debes. Porro uomitus maxime ualet
indiuertnis morbis ut est aqua intercus
& morbus comitialis & atrabilis & le-
pra, podagra & coxendix. At licet uomi-
tus multa adferat iuuamenta, morbos ta-
men non uideatur patere solet ut auditus gra-
uitate. Nec uenæ sectio uomitui coniun-
genda est, sed in tertium diem differenda,
præsertim si in ore uentriculi humor affu-
erit. Multoties præterea uomitus red-
ditur difficilis, ob humoris tenuitatem
quo fit ut crassior reddendus sit sumen-
do farinam granorum mali punici tosti.
Scire adhuc debes quod si post uomitum ex-
cernatur per aluum corruptum excremen-
tum, significatur nauseatiua satietate
expulsam fuisse deorsum. Vomitus autem
post alui deiectionem significat ex alui ac-
cidentibus id fieri, & commodius tempus

ad vomitum est æstas propter eius raritatem. Valet præterea uomitus ad mēbro-
rū soporē, nocet tamē oculis. Prægnantē
quoq; mulierem ad uomitū ne ducas, nā
excremēta corporis ipsius nō expellunt
per eum, uomitus autē ac labor eā in per-
turbationē ducunt, ideo sistat. Quibus-
cūq; uero aliis uomitus acciderit opitu-
landum est.

Caput .xii. fen quartæ, Quid'a uomitu
agendum.



Vm uomitū quis peregerit, fas-
ciem ac os aceto aqua tempera-
to abluere debet ut grauedo q̄
forte capiti illata est remoueat
& de mastiche aliqd deuoret ex uīno ma-
lorū, & cibū ac aquæ potū euītet, quiesce-
re q; p̄seueret & partes precordiorū iun-
gat, balneū quoq; ingrediat ac cito se la-
uet & egrediatur ab eo. Q; si a cibo ab-
stinere nō possit comedat aliqd delecta-
bile bone substantiæ facilis cōcoctionis.

Caput

Caput. xiiii. fen quartæ, De uomitus iu-
uamentis.



Vbet Hip. singulo quoq; mēse
uomitū fieri duobus diebus cō-
tinuis, ut secūdo die suppleatur
id quod prima deficit aut difficile fuit et
ut id qd ad uētriculū tractū fuit egredia-
tur, pollicet enim Hip. hac rōne sanitatē
cōseruari. Sed malū ē eū crebrius repete-
re. Hmōi præterea uomitus pituitam ac
flauā bilem eūat uentriculūq; expurgat,
nihilenim aliud uentriculū natura pur-
gat, ut sit intestinis quæ quidem a flaua
bile ad ea effusa purgant, remouetq; gra-
uedinem capiti euenientem visumq; a-
cuit, nauseatiuam satietatem pellit, & il-
li in cuius uentriculum bilis quæ cibum
corrumpit effunditur opitulatur, nā præ-
cedente uomitu cibus repurgatum stoma-
chū reperit, phibebuntq; uentriculū ab
abominatione rei pinguis, vereq; appe-
tentie deiectionē tollet, & ne acuta et aci-
da atq; acria desideret & cōfert lassitudi-

Fij

TREDECIMVM

corporis ac ulceribus renum & uesicæ ē quoq; præsentaneum remedium morbo elephantī & uitioso colori morboq; comitiali a uentriculo prouenienti morbo uere regio ac orthopnee tremorī ac resolutioni, estq; remediū efficacissimū illis q; inpetigie laborant. Debet autē semel aut bis in mense post repletionē ministrari, non obseruato aliq; statuto circuitu, neq; numero dierū certarū. Vomitus deniq; magis ei conuenit qui natiuo temperamento biliosus ac macilentus est.

Caput xiiii. fen quartæ, De nocumentis uomitus qui modum excedit.



I uomitus modū excedat procul dubio nocebit uentriculo cumq; debilitabit atq; dissoluet & ut materiæ ad eū tendat propensiorē reddet, thoraci quoq; ac uisui, dētibus, doloribus capitis diuturnis nisi per uentriculī cōicationem id fiat satis officiet. Sed et morbo comitiali qui
ex

ex capite fit nocet, & nō propter inferna
 pulmo hē mōdicus quoq; vomitus epar
 seindet venas, sūt tamē. Forte aliquas
 to repleri cupiunt, et cum nō possunt rē
 ferre ad vomitum se conuertunt, quod
 quidem negociū in pessimas ægritudi-
 nes diuturnas eos ducet. Debent igitur
 repletionē cauere cibūq; ac potū equare.

Caput .xv. fen quartæ, Quonam pacto
 puidendū sit casibus qui uomēti accide-
 re solent.



Væ uomitum prohibent abun-
 de a nobis dicta sunt tentioni
 uero ac dolori sub præcordiis
 euenientibus satis confert cale-
 facere ea fomentis aquæ calidæ madidis
 adhibitis, oleisq; lenientibus, cucurbitu-
 lisq; ignitis. Morsum uero ualidum qui
 in ventriculo relictus est tollit potus iu-
 ris pinguis facilis concoctiōis locumq;
 oleo uiolaceo iungere admixto oleo ex

DECI.QVINTVM

uiolis luteis seu albis q̄ cheiri ab arabibus uīcupat̄ cōfecto ex pauca cera. Sed si singltus accidat & p̄seruulsa mitiga-
ōe ac caligat. s uero vomitu, iā in sermo-
ne nocumentorū uomitus egimus. Tētis-
oni uero (quā tetanū uocant) ac morbis
frigidis ac sopori uociq; intercepte q̄ uo-
mitum subsequi solet succurritur extre-
morū deuīctione atq; forti frīctione ven-
triculiq; calefactione ex oleo oliuarū in
quo decocta sūt ruta & cucumeres silues-
tres (quī elaterium dicūt) & potu aquæ
mulsæ ex aqua calida q̄ remedio utatur il-
le qui sopore correptus ē in eiusq; aures
immittatur.

Caput .xvi. fen quartæ quid agendū ubi
vomitus modum exceſſerit.



S dormire debet omniq; indu-
stria somnus conciliandus est
extremaq; deuīciēda sunt ut
in aluo sistenda facimns, ven-
triculo

triculo quoq; remedio est ad mouere em
plastra uim astringēdi habētia, cōfortā
tia. At si uomitus immodicus fuerit, &
adeo expulerit ut sanguis euacuetur, tūc
potu lactis ex uino mixti, quattuor coty
larū quātitate (seu sextariōrū) id phibeas
tur, nā hoc lesionē medicamenti uomito
rii hebetat sanguinēq; phibet ac aluum
mollit. Qd' si præterea partes thoracis et
ventriculī a sanguine expurgare cupies
ris ne coaguletur, syrupū acetosū niue in
frigidatum sensim ei propinabis. Et ali
quando ad id ualet potus succi portulace
ex gleba armena. Ad si medicamē quod
excrementa uentriculī per vomitū euas
cuauit, modum excessisse metuis alio lo
co petenda sunt remedia. Vomitoria ue
ro medicamenta iuxta suos ordines & q
pacto quodlibet eorum propinari debe
at, & præsertim helleborus ex cōmenta
riis de compositione medicamentorum
ac de materia simpliciū medicaminum
petendum est.

DECI. SEPTIMVM

Caput. xviij. fen quartæ, De clysteri.



Lyster quidem est præstantissimū remediū pro excrementis euocandis ab ipsis intestinis ac admitigandos dolores renum & uesicę eorumq; apostemata, et ad ægritudines intestini coli, ac ad trahenda excrementa a membris principibus supremis. Verum acres clysteres epar debilitant febrimq; pariunt, ualēt præterea clysteres ad discutiēdas reliquias quæ post euacuatiōes relinquunt, forma uero clysteris & quo pacto fieri debeat iā in tractatione de dolore colico nobis explicatum est. Melior autem situs quo uti possit qui clysterem recipit est ut supinus iaceat deinde supra partē doloris accubat. Tempus uero cōmodius est quando ær frigidior existit, uidelicet ateq; grauedo molestia perturbatio ac animi deliquiū inualescat. balnei aut natura est humores excitare eosq; dissipare. Clysteris uero eos trahere qui retenti sunt iccirco ut plurimū

plurimum non iuuat preponere baleum clysteri. Et si quis intestina habuerit uulnerata indigeat tamen clysteri siue propter febrem siue ob aliam ægritudinem et timeat ne clyster retineatur, is procul dubio debet sedem ac vmbilicū aliasq; partes circumstātes milio calido calefacere,

Capur .xviii. Delinimentis



Nter remedia quæ essentiam morbi attingunt est linimentū quandoq; autem medicamentum ipsum geminas obtinet uires, tenuem uidelicet ac crassam, verum quæ tenuis est magis desiderat q̃ crassā. Q̃ si crassities eius tenuitati equetur cū fiet emplastrum pars quidem eius tenuis penetrabit, crassa vero retinebitur, acquiritur aut iuuamentū per id quod penetrat veluti solet efficere coriandrū, cū fit ex eo & polenta emplastrum ad strumas (scrophulas dicūt.) Emplastra tamē

DECIMVMNONVM

linimentis similia sunt uerum emplastra sunt crassa tenatia, linimenta uero fluida. Multotiens quoque linimenta admoventur ex frustis panis. Cum igitur membris nobilibus uelut iocinori & cordi imponuntur si huiusmodi panus ex cruda aloesuffitus fuerit sumopere iuuabit uiribusque linimentorum odorata uim praestabit prout res exposcet.

Caput. xix. fen quartæ, De embrochis seu irrigationibus.



Embroche quidem præstantissima præsidia sunt ubi desideratur ut a capite & aliis particulis aliquid dissoluatur, ac ubi necessarium est temperaturam aliquam permutare. Quod si aliqua membra postulant irrigationem calidam & frigidam si eo non confluant excrementa primo quidem calidam irrigationem mox aquam frigidam admovebis ut robur illis inferatur. Quod si contra res se habeat, tunc ab aqua frigida incipiendum est.

Caput



Venæ sectio ē euacuatio uniuersalis quæ plenitudinē euacuat & ipsa plenitudo est humorū generatio in venis, maior q̃ sua mediocritas exposcat. Vena autē incidi debet duorū alteri, nempe vel illi qui ægritudinibus obnoxius est, in quas corruiet si eius sanguis multiplicet, vel q̃ in eas iam incidit, horumq̃ vtriq̃ vel præ sanguis exuperantia vel præ eius malitia aut propter utrunq̃ vena secatur. ægritudines vero quibus ille paratus ē incurrere sūt coxendix & podagra si sanguinee eiusdemodi ægritudines fuerit dolorq̃ articularis qui a sanguine est & sanguinis screatus cum accidit alicui propterea q̃ in eius pulmone, aliqua venula rupta fuerit parum admodum conglutinata, quæ quidem scindetur si sanguinis vel minimum augeatur.

VICESIMVM

Ad hæc qui parati sūt in
 comitiales & attonitum (quē apoplexi
 iam nūcupant) ac atrā bilem ex sanguis
 redundātia & genera anginæ uiscerūq;
 abscessus atq; calidas lippitudines (quas
 ophthalmias dicunt.) Is etiā cui sanguis
 hemorroidarum qui consueuit effluere,
 suppressus est ac mulieres quibus mēses
 restricti sūt venæ sectione indigēt. Horū
 tamen duorum color non indicat neces
 sariā esse venæ sectionē, ob eorū squalli
 dum obscurum colorem albumq; atq; ci
 trinum. Porro qui membra intrinsecus
 imbecillia ex calida temperatura obtinēt
 his pfecto satius est tempore veris sang
 uinem detrahare etsi nondum in huius
 modi morbos inciderint. Item percussis
 vel alto delapsis sanguis demēdus est ad
 præcautionem, ne in eis apostema oriat.
 Adhuc aliquo apostemate laboranti de
 quo ne ante maturationem rumpatur ue
 reatur sanguis detrahendus est, etsi uenę
 sectione non indigeat neq; ulla adsit re
 dundātia.

dundantia. Scire quoque debes quod si in huiusmodi morbos nondum quis incidit, timeat tamen ne eis corripatur tutius ei concedi venæ sectionem. Sed si in eos iam lapsus fuerit tum in eorum principio penitus abneganda est, attenuat enim excrementa per corpusque ea permanere facit & sanguini integro ea quoque admiscet, immo nihil forte oportuni euacuationis cogetque venæ sectionem non sine noxa repetere ubi vero concoctio apparuerit et principium atque vigor iam transierit, tunc si venam secare est necessarium & nihil prohibeat secetur. Atqui nec venæ incisionis nec euacuatio est facienda in die motus morbi. est enim dies quatum requies tum somnus induci debet in eaque ipse affectus incitatur. Cumque ægritudo haberit iudicia (quæ crises appellantur) ac longi fuerit spatii, haud quaquam debet multa quantitas sanguinis euacuari imo si fieri potest quiescat sin minus parce fiat sanguinis detractio et sanguis qui per venæ

VICESIMVM

sectionem detractus est suppleatur corpori si poteris, robur quiriū custodias in iudiciorum pūgnam. Et si quis iam diu non est usus uenæ sectione & in hyme lassitudine corporis molestetur, ei pfecto uena incidēda est & sanguis ad uirtutem roborandam restituendus. Cæterum uenæ sectio trahendo ad contrariū alluum ualde astringit. Porro cū ex copiosa sanguinis missione vires imbeciliores redduntur multi humores uitiosi inde gignuntur. Animi autem deliquium quod syncopis uocatur, accidit quidem initio uenæ sectionis quia quod insuetū est obuiat præcedente tamen uomitu id prohibetur. Itidē efficit uomitus factus dū accidit syncopis. Nec te lateat uenæ sectionem perturbationem excitare donec quiescat. Dolor adhuc colicus raro cum sanguinis missione cōplicari potest. Gravidis præterea ac quibus menstrua redduntur non conceditur uenæ sectio nisi magna emergēte necessitate ueluti

si

si necessarium sit magnū sanguinis ex-
creatum sistere si vires cōsentiant. Scire
adhuc debes nō requiri semper uenæ sec-
tionē ubi adsint signa repletionis præ-
dictæ imo fortasse erit repletio ex crudis
humoribus & tunc sanguinis de tractio
ualde nocebit. Quoniam si uenam secu-
ris non fiet concoctio & uerēdum est ne
ager pereat. Ille præterea in quo atra bi-
lis superat nihil offēdetur si uena ei scin-
datur & postea purgatione euacuetur.
Sed ipsum colorem inspicere debes, sub
conditioe quam dicemus tentioemq;
animaduvertere nam si tentio per corpus
expandatur ipsa coniectura docebit ue-
næ sectionem esse necessariam. Sed si
sanguis eius optimus paucus fuerit &
in corpore multos humores uitiosos ha-
buerit, tunc sanguinis missio bonum
tollet & vitiosum relinquet. Sed si quis
paucū & malū obtinet sãgīnē et ad aliqd
mēbrū se cōuerterit ita ut illud ualde of-
fēdat, nec a uenæ sectiōe excusari possit,

mi deliquium infert, & ad purgationē magis facit, ad cōglutinationē uero tardior est, cōmodior autem est illi cui ut mūdificetur uena secatur, atq; pinguibus, itidem tempore hyemīs latior cōmodior est ob sanguinis coagulationem, æstate uero angustior si ea indiguerit. Cūq; uena inciditur iaceat supīnus, huiuscemodi enim situs est ad uirtutem custodiendam aptior, nec in animi defectum incurret. In febris aut uehementis inflāmationis, nō est uenæ sectio admittēda, nec initio cuiusuis febris non acutæ neq; in diebus circuitus, ubi præterea in febris cōuulsio associatur raro debet cōcedi uenæ sectio, quamuis uideatur esse necessaria quia conuulsio uigiliam atq; sudorem affert uiresq; deiciet, idcirco relinqui debet sanguis qui sit pro tempore necessitatis paratus. Itidē in febris nō putridis si sanguis mittatur sit exiguus ut p februm resolutione sanguis promptus dimittatur. Qd si febris non fuerit

post quadragesimum, & hæc est sententia Galieni, quamuis apparentibus ueris indicationibus satius erit eam q̃ citissime anticipare. Quod si id quod conueniebat neglexeris tunc quocumq̃ tēpore poteris uti uenæ sectione, dūmodo conueniat utere ea, consideratis tamē prius illis decem conditionibus iam dictis. Nonnū q̃ præterea fit uenæ apertio et si non indigeas ea in ipsis febribus, ut diminuta materia eam natura superare ualeat, ipsa tamen habitudine ætate viribusq̃ una cum reliquis, consentientibus. In febre uero ex sanguine pendente non potest euitari sanguinis detractio quæ in principio non exhuberans, tempore tamen concoctionis copiosa fiat. Sæpissimē tamen recedit ipsa febris post sanguinis detractiōem. Inhabentibus autem temperaturam immodice frigidā & in regionibus ualde frigidis & dū dolor ē ualidus & post balneū uires dissoluēs

VICESIMVM

atq; post ueneris usum, in etate quoq; minore quatuordecim annorū euitanda est uenæ sectio quoad fieri poterit, in ætate senii quoq; quātum fieri poterit caue ne sanguinē e uena mittas, nisi forte in corporis habitu ac musculorum dēsitate, uenarū amplitudine, earum plenitudine, ac coloris rubore cōfidamus. his enim hortantibus tam senioribusq; pueris potest concedi. Iuniores uero parca sanguinis subductione paulatim ad id duci debent. At quicūq; supra modum sunt obesi uel macilenti aut carnis raritatem obtinētes & pituitosi tumidiōres, & pueruli qui sunt sanguinis expertes his uenā incidere quantum possibile est caue, & qui diu ægrotauerint nō sinemaximo discrimine sanguinē detrahare licet, nisi forte in his sanguinis corruptio id hortaret, tūc enim potest sanguis mitti, & illum inspicere debes, qui si niger crassusq; fuerit eū extrahe. Sed si eum album tenuem uideris claude statim, quoniam maximū periculum

culum afferet. Post cibi repletionē q̄q̄
cauēdum est uenam incidere, ne humor
incoctus ad uenas trahatur loca rei euas-
cuatę, quod quidem obseruādum adhuc
est uentriculo existēte repleto, ac intesti-
nis, excremento sicco concocto uel fere
concocto abundantibus. Sed quod in ip-
so uentriculo & sibi annexis existit uō-
mitu euacuare studeat, ab intestinis uero
inferioribus ut fieri poterit etiam si cly-
steri id fiat. Porro qui fastidio laborat
caueat uenam aperire sed differt donec
eius satietas cōcoquatur. Caueas etiā ne
uenam incidas eius qui acumē sensus uē-
triculi uel imbecillitatem & generatiōe
bilis ī ipso uētriculo infestari solet, is ca-
uere debet ne a uenę sectione incurrat
periculum, & præsertim dum est ieiun-
nus. Eum autē qui acumē sensus oris uē-
triculi obtinet, cognosces, quia a rerum
mordicantium deuoratione molestatur.
Qui uero imbecillū ipsum habet, eo qd
ipsam quoq̄ appetentiam habet imbecil

VICESIMVM

lem, doloresq; uentriculi patitur. At cū
 ius orificium uentriculi choleram reci-
 pit, vel solet sæpissime in eo generari, ex
 assidua nausea, ac frequētissimo bilis uo-
 mitu, nec non ex eius oris amaritudine
 id dignoscere poteris iis inq; si uena fe-
 riatur, non habita præcautione prius ad
 oris uentriculi confortationem, in maxi-
 mum incurrent discrimē, & forte aliqui
 eorum mortem subibunt. Quo circa si
 quis acute sentit, vel qui imbecillioris uē-
 triculi est, debet sumere frustra panis pu-
 rissimi musto cocto acetoso odorato p-
 fusa. At si ea imbecillitas a frigido tem-
 peramento proueniat, tunc debes ea per-
 fundere, aqua muscata (quā such vocant
 arabes) cū aromatibus, aut syrupo de mē-
 ta odorato in quo muscus ingreditur,
 aut miua muscata, deinde uena secetur.
 Ille uero in quo bibis generat, debet uo-
 mitū aqua calida liberalissime epota pro-
 uocare, ex syrupo acetoso deinde aliqd
 degustare, parumq; quiescere, mox uenā
 secare,

secare, oportet autem uti omni diligencia, vt id quod de optimo sanguine depeditum est restituatur, veluti carne super carbones assa si robustus fuerit, quāuis sit is cibus satis grauis, nam si concoquatur in multum ac optimum conuertetur alimentum, debet tamen esse id exiguae quantitatis, quia venæ sectio imbecillē reddit ventriculum, porro quandoq; inciduntur venæ, vt profluuium sanguinis e naribus vel utero aut sede vel ex thora ce prohibeatur, aut ex aliquibus uulneribus, ut ipse sanguis ad oppositam retrahatur partem, hoc enim est præsentaneū remediū, foramen autē debet esse ualde angustum, uicesq; debent pluries iterari non tamen eadem die (nisi urgente necessitate) sed alternis diebus, & qualibet uice minor fiat de tractio, & ut summatim dicam, pluribus uicibus sanguinē detraheñ, satius ē, q̃ multiplicā quātitatē, ferire præterea uenā, cū nō fuerit

VICESIMVM

necessarium, bilem incitat, ariditatemq;
 linguae relinquit & alia id genus, cui rei
 succurrēdū est, aqua ordeī ex saccharo &
 si quis sanguinis missionem repetere vo-
 luerit, & ex priori uenae sectione, nullū
 cōuulsionis nocumentum sequutū fue-
 rit, vel aliud simile, uenam manus p lō-
 gum debet incidere, vt motu artus phī-
 beatur conglutinatio & dilatetur. Sed si
 adhuc dubitaueris ne celerrime coales-
 cat, tunc pānum oleo, & pusillo salis ma-
 defactum superponas, qui superligetur,
 porro, si quū uenam a pueris scalpellū p
 unxeris, uelox quidem cōglutinatio pro-
 hibebitur dolorq; mitior erit dūmodo le-
 niter, oleo uel alio simili superinungat,
 aut ipso oleo madefiat deinde panno de-
 tergatur. Dormire insuper inter uenae
 sectionem, & iterarionem, foramen coas-
 lescere celeriter cogit. Nec obliuioni tra-
 das. quod diximus solutiua euacuatio-
 nē in hyeme, diem austrinā desiderare,
 idem enim expostulat ipsa uenae sectio,
 foramē

foramen præterea uenæ sectæ, deliranti
um & stolidorum, ac eorū quibus noctu
tempore somnii, sanguis imittendus est
debet esse angustum, ne sanguinis pflu-
uiū inducatur. Identidem cui nō est ne-
cessaria iteratio, fieri debet. Nec te lateat
iterationem esse tardandā, iuxta magni-
tudinem imbecillitatis. Quod si nulla af-
fuerit imbecillitas eius terminus est una
hora. At si per huiusmodi sanguinis mis-
sionem intendimus attractionem facere
tunc eius terminus erit unus dies. Obli-
qua autem uenæ apertio, illi qui eadem
die, ea uero, quæ per latitudinem, illi qui
statim eam iterare proposuit, conueniē-
tior est. Sed quæ per longū fit, magis cō-
uenit illi, qui non est contentus una tan-
tum iteratione. & illi qui p multos dies,
quotidie uult de suo sanguine aliquid
detrahere, & quanto uenæ apertio maio-
rem intulerit dolorem, tanto tardius cō-
glutinabitur. Porro quū per iterationē
uberrima fit euacuatio, affert animi deli-

VICESIMVM

quum nisi forte corpus ad plethoriam declinet, aut ille cui iteratio fit, aliquid præassumpserit. Inter nenæ apertionē præterea & iterationem, dormire, excrementa cum sanguine expelli prohibentur, cum humores per somnum ad imam partem corporis retrahantur. Inter cætera autem iuuamenta iterationis unum ē uidelicet, q̄ vires illius cui sanguis mittitur conseruantur, ac euacuatio ei conueniens perficitur. Melior uero iteratio ē quæ duobus aut tribus differtur diebus. Ad hæc illico a venæ sectione, dormire lassitudinem membrorum inducit. Balneum quoq̄ ante uenæ sectionem fortasse reddet eam difficilem, quoniā cutim crassionem ac leniorem efficit, eamq̄ lubrico lapsu parat, nisi is crassissimū habuerit sanguinē. Ille præterea cui uena secatur, non debet unica uice tantum cibo repleri. Sed sensim cibari, & i primis tenui uictu uti. Neq̄ post eam quoq̄ deambulare debet. Sed supinus iacere, nec post

post eam etiam debet vti balneo dissoluente. Et cum ex uenæ sectione, manus intumuerit alterius manus uena secari debet & quantum vires ferunt sanguinē extrahere, & tumori unguentum cerusæ admoueatur, & partes circumiacētes, re mediis uehementer frigidis liniantur.

Si quis præterea abundantiam humorū habuerit & ei uena fereatur, ipsa quidē venæ sectio erit causa irritationis illorū humorum velocisq; motionis ac mixtionis eorum, indigebitq; frequenti venæ apertione. At hæc sanguis melancolicus frequentem desyderat venæ sectionem, quam statim alleuiatio excipit. In senectute tamē aliquas postea inducit egritudines ut morbum attonitum (apoplexi am vocant) porro venæ sectio sæpissime excitat febres. Sæpissime tamen putredinem dissoluit. Cuicūq; præterea sano sanguis detrahitur assumendum est id quod in tractione de uino prædictum est. Nec te lateat, nihil aliud q̃ venas

VICESIMVM

vel arteries in corpore aperiri, sed arteri
 as rarius, idq; non sine discrimine ob san-
 guinis profluuiũ, & raro generat aposte-
 ma, & id quidem quũ scissura fuerit ual-
 de angusta. uerum cũ non timemus san-
 guinis profluuiũ arteriæ, summopere iu-
 uat in quibusdã ægritudinibus particu-
 laribus, propter quas inciditur ipsa arte-
 ria, præcipuum autem iuuamentum, qđ
 ex arteriæ incisione acquiritur, ẽ ubi in
 aliquo membro ei uicino aliqua malig-
 nã ægritudines fuerint, quæ a sanguine
 tenui calido dependent. Si igitur incida-
 tur arteria illi uicina nullo iminẽti peri-
 culo, tunc summopere opitulari uidetur.
 In manu autem lex uenæ inciduntur ui-
 delicet capitalis (quem uocãt cephalicã)
 & media (quam nigram appellant) & ie-
 coraria (quæ basilica nuncupatur) & fu-
 nis brachii, & quæ inter ânularem & mi-
 nimũ digitorum intercurrit (quam uocant
 arabes sceilem.) Et axillaris, quæ est ras-
 mus iecinorinæ, sed inter omnes cepha-
 lica

lica est tutior. Et quęlibet illarum trium debet supra angulum cubiti brachii incidi non infra, neq; e regione ipsius, ut sanguis possit cōmode egredi quum destillet. Nocumētaq; neruorum atq; arteriarum tutius euitantē, itidem de cephalica intelligi debet, Incisio tamen earū per longum tardius conglutinetur, quoniam sunt articulosę, in non articularibus uero res opposito modo se habet. Sed uena coxę dicis ac ānularis & reliquę uenę debent per longum incidi. Cephalica aut debet incidi infra caput musculi in loco molliori, & foramen amplum fieri. Nec foramen foramini addatur, quoniam apostema parit. Et si quid erroris cōmitatur in uenę cephalicę sectione, ut plurimū id non committitur unica tantū percussione quantūcūq; fuerit magna. Sed lāsio ex iteratis percussionibus infertur. Eius uero sectio quę tardius coalescit, est illa quę fit per longum. Quod si sectionem te iterare cogitas, dilata foramē, & si nō

VICESIMVM

inueniatur, queratur aliquis ramus par-
tis exterioris brachii. At media uena, ob
neruum sub ea existētem periculum mi-
natur. Nonnūq̃ tamē inter duos neruos
iacet, & tunc oportet uti omni diligētia
ut per longum incidatur, eiusq̃ sectio ue-
nam leniter perstringat, & fortasse super
ipsam extabit aliquis neruus tenuis in-
star chordæ intētus, quæ quidem res dig-
nosci debet, & caueri ne percussio eū of-
fendat, quoniam diuturnā sensus destru-
ctiōnem pariet. At qui neruos crassiores
obtinet, is ramus in eo manifestior est, in
quo si error cōmittatur erit maioris no-
cumentī, quod si error cōmittatur & per-
cussus fuerit ille neruus, non agglutines
sectionem uenæ sed admove ei, quod cō-
glutinationem cohibeat, & cura eam cura
tione uulnerum neruorum, de quibus iā
in libro quarto fecimus sermonem.
Caue præterea ne quod infrigidet, ut est
succus solani & sandalū ei admoveas,
sed

sed eius partes totumq; corpus calido o-
leo perungas. Venam aut funis brachii
satius ē in obliquū secare, nisi utriq; sub
terfugiat, tūc enī in lōgū incidat. Basili-
ca uero maxio cū discrimine icidit, ppte
rea q; arteria ac muscoli neruiq; sub ea
existūt, animaduerte igīt in eius incisio-
ne, qm si icidat arteria vl' nullo modo, uł
cū maxima difficultate sanguis sistet, sūt
præterea aliqui habētes utriq; circū basi-
licā duas arterias quarū si una describat
existimatur esse in tuto, cū tñ forte feriet
altera. Id aut animaduetēdū ē, & cū ligat
apparebit ibi ut plurimū tumor vel arte-
riæ, quādoq; vel basilicæ, sed utcūq; fue-
rit debet solui deligatura tumorq; blādi-
terungi, deinde iterū ligare. Qd' si iterū
tumor redeat, tu q; iterū redi ad idē, & si
id nō sufficiat, nō erit iutile si basilicā di-
mittas, & ramū q; dicīt axillaris q ad iter
nā ptē brachii ifra existit icidas, mltoties
q; tumor augeat, & multoties ligatura se-
dat pulsū arterie, eāq; eleuat et attollit &

VICESIMVM

pro uena reputatur, & inciditur, cūq; ali-
quam ligaueris uenam & ex huiusmodi
ligatura appareant super ipsam ueluti lē-
ticulæ & cicera, tūc quod de basilica dixi-
mus idem hic agere debes, Basilica insu-
per quanto inferius ad brachium eam in-
cidas, tātō tutius est. Scalpellum autem
debet per uenam procedere uersus oposi-
tam partem arteriæ, & error qui in basili-
ca comittitur, non est ratione arteriæ tā-
tum. Sed quia sub ea est musculus & ner-
uus, & eorū causa error cōmittitur ut iā
paulo ante diximus. Iudicium uero quo
dignoscere possis errorē fuisse cōmissū
in basilica & fuisse percussam arteriam, ē
quia sanguis tenuis egreditur flauus &
quodā ueluti saltu ei aculatur, leniq; ac
demisso quodam tactu, & tunc debes ce-
leriter aliquid inforamē intromittere ue-
lut pilos leporis ex aliqua portione thu-
ris in puluerem redacti, & achilleā fideri-
tem (quam supercilium ueneris, & sang-
uinem draconis uocant) & aliquid aloes
& mirræ

& mirræ & chalcitidis & mysi, et aspergere cum aqua frigida quantum poteris, locum autē incisionis arcte liga, qua astricta non soluatur per tres dies, post tertium uero diem adhuc debes obseruare, quantum poteris, ut emplastra astringentia ei parti adhibeantur. Multi tamen sunt qui illam arteriam penitus secant ut uena conuellatur & carne cooperiatur astringatque, sed complures ob sanguinis profluium perierunt. Aliqui etiā ob uehementē dolorem ligaturæ cuius strictura ualida queritur ad prohibendum fluxū sanguinis arteriæ, ita ut membrum ad perditionem deuenirit mortem subierunt. Nec te lateat quod nonnuncque sanguinis profluium accidit quoque in uenis.

Ad hæc scire debes, quod uena humeralis ex collo & supra ipsum magis, infra uero, minus de sanguine euacuat, nec terminum regionis hepatis ac partium precordiorum transit, neque de inferioribus partibus aliquid educit, quod alicuius sit mo-

VICESIMVM

menti. Mediā prætera, commune habet iudiciū inter cephalicā & basilicam, et ipsa iecinoriā euacuat a partibus thoracis, quæ ad inferiora uergunt. Et brachialis similat cephalicæ, ea uero uena, quæ sceilen uocant, dextra quidē ut aiunt doloribus hepatis, sinistra uero lyenis conferre uidetur, & ut debeat aptio eius tandiū dimitti, donec sanguis sua sponte sistat. Manus præterea eius cui uena secat debet calidæ aquæ admoueri, ne sanguis facile retiniatur dum segnius fluit ut pluribus eorū quibus uena sceilen secat euenire solet, præstantior autē sectio ipsius sceilen est, quæ in longum fit. Axillaris uero idē est cū basilica iudiciū. At qui arteria, quæ in manu inciditur, est illa quæ super dorsum palmæ existit, quæ inter indicē & pollicē iacet, & est præsens remedium epatis ac septi trāsuerſi doloribus antiquis, & Galenus refert se uidisse in somnio uirum dolore epatis laborātem, cui præcepit hoc, & ita fecit, unde sanatus

tus

tus fuit. Secatur adhuc nonnunquam alia arteria, quæ magis hac ad internam partem palmæ declinat, quæ quidem simile huic affert iuuamentum. Si quis præterea uoluerit e uena manus sanguinem emittere, & non potest, nequaquam uiolentam inuolutionem, ac delegationem, importune agat neque percussione scalpello itetet, sed sic per diem uel biduum dimittat.

At si cogatur percussione iterare, eam quidem supra non infra primam iteret.

Violenta autem ligatura apostema affert.

Infrigidare quoque fasciam, eamque ex aqua rosacea uel aqua frigida humectare satis conuenit & confert, ligatura quoque non di moueat cutem a suo loco nec ante nec post uenæ sectionem. Valida præterea deligatio in corporibus macilentis est causa inanitionis uenarum ac sanguinis retentione sed in pinguioribus lenta non permittit apparere uenas, nisi ualida fiat.

VICESIMVM

Quidam quoque eorum qui uenam incidunt solent uti astutia ut dolor non percipiatur, soporem manui ex forti ligatura inducēdo per horam. Nonnulli tamē scalpelli aciem oleo perungūt & hoc ut paulo ante diximus dolorem mitigat, cōglutinationemq; remoratur. Cūq; predictæ uenæ in manu non apparuerint sed ramī earum, tunc manu præmi debent fricando. Quod si cessante frictione confestim eo fluxerit sanguis quod & locus intumescat, tunc incidātur, sin minus nequaquā. At cū abluere uoluerit trahat parū cutim ut foramen claudat, mox suo loco eam restituat, fascia aut optime adhereat. Estq; cōmodior q̄ in orbem fit inuolutio earq; superinuolui debet. Cūq; in foraminis orificio pinguedo apparuerit, sensim intro reuocari nec abscindi debet, neq; in his est adhibenda diligētia ut fiat iteratio sine percussione. Huius tamen negocii sententiā adhuc perficiā in calce huius capituli, nam interloquendū

dū de eo obiter in sermonem incidimus. Nec telateat sanguinis astrictiōem, incisionisq; ligationē, habere tempus sibi statutum, & si id diuersum sit, nam aliq; & si febriens fuerit, poterit ferre emissiōem quandoq; aut sex librarum sanguinis, quidam uero & si sanus, adhuc unius libre extractionem sustinere nequit. Circa hoc tamē tria sunt cōsiderāda, primo leuitas raritasq; sanguinis, secundo color eius, fortasse tamen faciet in maximum incurrere errorem si primo tenuis ac albus egrediatur. At si signa plethoriæ ibi appareant & res ipsa sectionem uenę expostulet non decipiaris. Quandoq; et sanguinis color fallit in habentibus aliqua apostemata, quoniā apostemata trahit ad se sanguinem. Tertio uero pulsus quem haudquaquam negligere debes. Cūq; sanguinis ipetus exitus languere cōperit, aut color sanguinis, uel pulsus ipse mutati fuerint præsertim ad debilitatē tunc eum retine, itidē si oscitationes ac

Hiij

VICESIMVM

pandiculationes nauseaq; acciderit. Qd
 si cito color aut impetus mutetur r̄curre
 adpulsum, cui adhibenda est in hac re fis-
 des. Incurrunt præterea facillime in ani-
 nimi deliquiū, qui calidi sunt tēperamē-
 ti macilēti & corpore raro, difficiliorē ue-
 ro qui temperaturam moderatā carnisq;
 densitatem obtinent. Dicitur adhuc, q
 qui secāda uenæ artē profiteſ, debet plu-
 ra habere scalpella, quorū aliqua latiorē
 aliqua uero āgustiorē habeāt aciē. Quæ
 latioris sunt acuminis, uenis quidē fugi-
 entibus ac declinantibus maxime acco-
 modātur, ut sūt uenæ iugulares. Is adhuc
 debet habere pillulā bōbacineā uel seris-
 cinā. Habeat quoq; iſtrumēta ad uomitū
 faciendum idonea, siue ex ligno siue ex
 pēna fuerint. Nec omittat habere apud
 se pilos leporis & medicamen aloes &
 thuris, folliculum musci & electuarium
 actrochiscos de musco, adeo ut si acci-
 dat animi defectus, qui quidem in sang-
 uinis, missione maxime timorem affert,
 imo,

immo forte mortem, festina igitur tunc
intromittere glomum in os ipsius ac uo-
mitum puocato, instrumēto illi negotio
accōmodato, eumq; folliculū odoret, ali-
quid quoq; electuarii aut trociscorū de
musco deuoret ut uires excitent. Quod
si sanguinis profluiū ex arteria pueni-
at, festina replere foramē leporinis pilis
medicamētoq; aloes. Et raro accidit syn-
copis dum sanguis agreditur, sed ut plu-
rimum postq; sanguis susterit accideri so-
let, nisi forte plus iusto effluerit. In fe-
bribus autem cōtinuis, ac in initiis atto-
niti morbi (apoplexiam uocant.) In an-
ginis magnisq; abscessibus interimen-
tibus ac ualidis doloribus uirtute existē-
ti forti, n̄ perterriaris si uideas syncopim
accidere. Sed quoniam interloquēdum
de uenis manus incidimus in amplissimā
orationem de aliis negociis adeo
ut & uenas pedis aliasq; omiserimus,
ideo iustum iudico ad sermonem una
de digressi sumus redire.

VICESIMVM

Dico igitur inter uenas pedis. Aliam quæ
 dem esse coxendicis, quæ in extrema parte
 malleoli inciditur siue supra, siue infra
 ipsum deligandaque est pars suprema, uis
 delictet a crure usque ad foramen, stricteque
 deuoluenda, satius quoque est eam antea
 abluere, in longumque incidere. Quod si
 obscura fuerit, incidatur aliquis ramus
 eius, qui inter annularem & minimū di
 gitum existit. Incidere autem coxendicē
 efficacissimū affert præsidium, & præsertim
 podagræ, uaricibus, morboque ælephati,
 sed iterare eius incisionem difficile quid
 dē est. Alia uero est ea uena (quæ saphenæ
 nam uocant) quæ in interna parte malleoli
 locata est & magis quam coxendicis est eui
 dens, hæc autem ad euacuandum sanguinē,
 a membris, quæ infra hepar existunt, eui
 que a supernis partibus ad infernas euocan
 dum inciditur, & ideo menses uehemen
 ter citat orificiaque mariscarū aperit, por
 ro licet ratio ipsa dictitet sectionē uenæ
 coxendicis & saphenæ, iuuamentū non
 absi

abſimile præſtare. Experientia tamen cõ
probatum eſt, longe efficacione eſſe uti-
litate incifionis uenæ coxendicis indo-
lore coxendicũ, & id forte propter eius
rectitudinem prouenit. Venæ prættrea
ſaphenæ ſectio præſtãtior eſt, q̃ fit in ob-
liquũ ad latitudinẽ uergens. Alia adhuc
eſt uena, q̃ in angulo genu exiſtit nec ei-
ius præſidiũ eſt mltũ diſſimile ab eo qđ
ſaphenæ. Verũ ad menſes ciendos & ſe-
dis hemoroidarũq; dolores, præſtantius
q̃ ſaphenæ eſt remedium. Itẽ ẽ alia uena
in poſtrema parte calcanei ſita, q̃ ẽ ueluti
ramus ſaphenæ, & ualet ad ea q̃ & ipſa ſa-
phena. Generatim aut uenarũ pedis inci-
ſio, ad egritudines, q̃ fiunt ex materiis ca-
put petentibus ac ex atrabile ortis ualet
ſed uires magis q̃ ea, q̃ uenarũ manus de-
bilitat. Ad hæc uenæ, q̃ in partibus capi-
tis inciduntur, ſatius ẽ eas in obliquum
incidere præter iugulares (guidez Ara-
bes uocant.) Inter uenofa præterea uafa,
q̃dam ſunt uenæ, quedã Arteriæ. Venæ

VICESIMVM

rum autem alia est uena frontis, quæ in
 duo supercilia insidet, cuius incisio con
 fert dolori capitis & præsertim in occi
 pitio eius grauediniq; oculorū atq; anti
 quo capitis dolori assiduo (cephaleā uo
 cant). Alia uero est quæ super caluariam
 sedet ad hemicarneam & capitis ulcera
 secta iuuat. Alia adhuc duæ sunt, quæ a
 pud utraq; tempora extant reflexæ uenæ
 ac alia duæ in angulis lachrymalibus (cā
 tos uocant) q̄ ut plurimum, non se offe
 runt, nisi per gutturis suffocatiuā astric
 tionem, in quibus scalpellum nō debet
 profundius agi. Quoniam forte ex ossis
 percussione affectus ille oriretur (quem
 aegylopē seu fistulā lachrymalē uocant)
 ex eis tamen exigua quantitas sanguinis
 distillare solet. Earum aut sectio ad dolo
 rem capitis ac hemicraneam, lippitudi
 nemq; diuturnam (quam obthalmiā uo
 cant) ad lachrymarum distillationem, ad
 suffusiones, seu cecitates, ac ad palpebra
 rum scabiē, earumq; ortum & ad nictilo
 pam

pā satis ualet. Alie quoq̃ sunt tres uenæ
exiguæ, q̃ ubi desinit exerema pars auris
capillis coniuncta existūt, earū autem ul
tima trium euidentior est, q̃ in initio suf
fusiōis & ubi caput recipit uapores a uē
triculo secatur, & propterea iuuat ad au
rium ulcera & occipitis & partis postre
mæ capitis. Galenus autem negat id q̃d
nonnulli affirmant uidelicet, q̃ uiri cōti
nentes secant ambas uenas q̃ sūt post au
res, ut uirile semen illinc abscindatur.

Sūt & aliæ duæ uenæ iugulares q̃ i prin
cipio lepræ & ualidæ anginae incidunt
& in respirādi difficultate (dyspnoea uo
catur) & in asthmate calido, & in uoce
rauca, q̃ inest patientibus pulmonariā
ægritudinem (quam p̃ipeumoniam ap
pellant) & in mentagra, seu lichene, p̃ ex
excessiuo calore sanguis puenit, ac i lye
nis affectibus et p̃cordior. Et ut pau
lo āte diximus huiusmōi icisio debet fieri
lāceola latioris aciei ligatura aut debet fi
eri capite, iclinato ad oppositā ptē secti
onis ut uena tendat.

VICESIMVM

Inspiciēdaq; est ea pars, q̄ est procliuior, cuius quidem pars opposita est incīdenda, & obuolutio debet in latum, nō in lōgum fieri ueluti fit in saphena & coxendice, incīdio tamen debet in longum cadere. Est & alia uene, q̄ ē in extrema pte nasi (quam uocāt leporinam) & incidit pars extrema nasi bifida, q̄ digito pressa bisulca uidetur ibiq; perforetur. Sanguiis autem qui de ea fluit exiguius est, cuius sectio ualet ad lētigines faciei ob scurritatemq; coloris, mariscas, exāthemata, seu tubercula nasi ad eiusq; pruritū, uerum aliquando inducit diuturnam rubedinem faciei, q̄ serpigini similatur, quidem adeo per faciem expanditur, ut eius nocumentum maius sit iuuamento. Venæ uero, q̄ sūt post aures sub ossibus eminentibus e regione occipitiī (Arabes cāsasa ea ossa uocant) si incidantur, conferunt lippitudini, q̄ extenuat sanguine oritū habet ac diuturnis capitis doloribus. Alie insuper sunt uenæ quattuor, quæ
super

super labia iacent, binæ scilicet super singulo labio. Quarū incisio ulceribus oris ac faucium (Alcola Arabes uocant) nec non gingiuarū earū relaxationi, atq; abscessibus & hemoroidibus earūq; scissuris confert. Sunt & aliæ uenæ sub lingua intra mētum, quæ ad anginas apostemata tonsillarum (seu ut uocāt duarū amigdalarum) incidūtur. Reperiuntur adhuc aliæ uenæ sub ipsamet lingua, q̄ ad grauedinem linguæ, quæ a sanguine est orta inciduntur, & per longum incidi debent, nam si per latum incidantur, difficile erit sanguinē sistere. Est quoq; alia uena in yma parte labii, quæ ad oris fetorem inciditur. Item reperitur alia uena mandibularū, quæ ad oris uentriculī corruptionem inciditur. Arteriarum autē capitis quædam est apud tempora, quæ aliquando more aliarū aperitur, aliquando uero tota discinditur, nōnūq; etiam distrahitur, quandoq; uritur, idq; ut acres actenuēs destillationes sistātur fieri so-

VICESIMVM

let, ut quum oculus dilatari incipit. Sūt
 & aliæ duæ arteriæ post aures, quæ ad
 uaria lippitudinis genera ac principum
 suffusionis hebetudinemq; oculorum et
 nyctilopam & ad dolorē capitis diuturnum
 inciduntur, non tamen sine discrimine,
 earumq; agglutinatiō tardior est.
 Galenus autē narrat quēdam fuisse uul-
 neratum in gutture, ita ut uulnus eius ar-
 teriam atigerit, unde immodica quantitas
 sanguinis effluxit, cui ipse Galenus
 succurrit, medicamē ex Thure & Aloes
 & Achilleæ, & Myrræ itaq; sanguinem
 suppressit dolorq; diuturnus, quē in co-
 xa hēbat ablatus est. Ex uenis præterea,
 quæ in corpore aperiuntur duæ sunt super
 uentrem, quarū altera sup regionē hepa-
 tis iacet altera uero super lyenē, ea autē q̄
 in dextra, ad aquam inter cutim, q̄ uero
 in sinistra parte existit ad lyenis affectus
 inciditur. Nec te lateat uenæ sectionem
 haberi duo tempora. Alterꝝ liberꝝ, alterū
 uero coactū, ex arbitrio quidē est, dum
 calor

calor diei adest perfecta iam cōcoctiōe,
uolentum uero tempus est, dum urget
necessitas ita ut differri non possit, om-
nisq; causa, q̄ eā phibeat neglienda est.
Scias adhuc q̄ lanceola nō acuta magnū
infert nocumentum, qm̄ nō pertingēdo
fallit, & apostema atq; dolorē parit, cū q;
lanceolā intromittis, nō inpellas eā ma-
nu comprimēdo. Sed sensim p̄trāsēdo
eam ducas, ut eius extrema pars, cauitatē
uenæ attingat, nā si pluribus uicibus, id
ui iterare conaberis, eius extrema acies
occulte disrūpet & sic uena sup̄terfugiet
& nō scindetur. Quod si in coneris uenā
incidere, malū addes. Idcirco ante q; ue-
nam ferias, & quādo percussionē iterare
cupis, debes experiri in tua cure, q̄ pacto
lanceola se habeat, oī præterea industria
conari debes ut uena impleat s̄guīe q; tu-
mescat. Sic enī lubricus lapsus ac r̄cessus
eius minus fiat. Qd̄ si uena occulta fue-
rit nec r̄pletio sub digito appareat, tū ite-
rū atq; ierū eam solue et liga, atq; punge,

VICESIMVM

& deligationem modo sursum modo deorsum permuta donec se offerat, idq; tibi succedet, si latitudine extremitatum duorum digitorum locum ubi scis uenā expandi palpaueris, ita ut quandoq; altero digito premas, altero uero sanguinē e uena eminere facias, ita ut digito, qui pmanet firmus manifeste percipias & dū eleuatur uacuetur, & dum remittitur obseruetur, & inter ultimam lanceolæ extremitatē & manum, aliquantula debet intercipi distantia, ne ad neruū uel arteriā eum penetrare faciat, tutiusq; est ut uena impleatur ubi sit tenuior, lanceola insuper debet pollice & medio digito apprehendi indexq; dimittatur ad tētandum, ac in media lamine apprehendi debet & non supra, quoniam non esset recta apprehensio. Cūq; uena ad aliam partē demonstrata fuerit occurras ei ligatura & apprehensione contrarie partis. Quod si utrimq; dimoueatur indifferenter, caue ne eam per longum incidas. Scias adhuc q; deligatio &

gatio & depressio debet fieri iuxta duritiē ac cutis crassitiem & carnis multitudinē, debetq; ipsa deligatio proxima fieri. At si deligatio uenam occultauerit, describe eā, & caue, ne ipsa descriptio, mobilitate ligaturæ recedat, a sua rectitudine, & cum hoc adhuc suspende uenæ incisionem, quod si uena cum difficultate repleatur & eleuetur, tūc profunde incide præsertim in macilentis corporibus, & utere uncino, cūq; ligatura et astrictio fit, ppe artū, nō sinīt uenam repleri & cū locum lauare cupis tunc digitis cutē sup foramen trahe, ut e regione tegatur mox laua, & exicca, fasciolāq; imponas & sinito cutem ad locum suū reuertī. Nec te lateat eū qui præ nimia plethoria, sudat, uenæ sectione indigere, nōnunq; præterea alicui febriēti, ac morbo comitiali laborāti cui pro ut eius adfectus exposcit sangnīs missio conueniret, superueniet naturalis alui solutio & tunc ea non indigebit.

VICESI: PRIMVM

Caput xxi. fen quartæ, De cucurbitulæ
rū impositione ac de earū sacrificatiōe.



Vcurbitulæ magisq̃ uenæ se-
ctio partes subcutaneas expur-
gant, ac magis tenue q̃ crassum
extrahunt, pinguibus tamē cor-
poribus, q̃ crassiores sanguinē obtinent
minus opitulātur. Quoniā nō educunt
sanguinē eorū ut deceret, sed tenuiorem
eius portionē, idq̃ maxima difficultate
extrahunt, particulā quoq̃ ubi infigunt
ibecilliorē reddūt, ex præcepto adhuc est
ne cucurbitulæ admoueāt in initio men-
sis, qm̃ humores, nōdū sunt moti uel ex-
citati, neq̃ in eiuscalce, cū sint diminuti
sed in medio eius dum humores excitan-
tur qui suo incremento, insequuntur in-
crementum quod in substantia lunæ au-
get̃ crescitq̃ cerebri medulla in caluaria
aquæ quoq̃ fluminū fluentiū ac refluen-
tiū augentur. Diei autem hora cōuenien-
tior ad earū defixionē, est secunda & ter-
tia, post balneū insuper admoueri nō de-
bent

bent nisi forte quis crassū habuerit sang
uinē, tūc enī debet balneo ablui deinde
aliquantulū morari, mox cucurbitulas
iponere. Maior aut pars hoīum recusāt
appositionē cucurbitularū in syncipite
q̄a percipiūt & sēsū & mentē ex eis of
fendi, sed si in caua pte occipiti adhibeā
tur, incisionis uenæ mediæ suplēt uices.
Grauitati quoq̄ sup̄ciliōrū auxiliū prae
bent & palpebras alleuiat ac oculos sca
biei orisq̄ fetori opitulant, et si super sca
pulas (cahal arab. uocāt) infigant incisi
onis incinorinae uenæ, uicē gerūt, dolo
rēq̄ hūeri & guttutis leuant, & si sup̄ ala
teram duarū uenarū colli posteriorum
inponāt, p̄ cephalica ualent, & tremorē
capitis leuant, mēbrisq̄ capitis cōferūt,
uelut sunt facies dentes mādibulae aures
oculi, guttur, nares. Verū ut inquit Mu
hamat. Si cauitati occipitii iponant obli
uionē inducūt, cū posterior pars cerebri
sit locus mēorie, quē cucurbitule ibecilū
reddunt, sed si sup̄ cahel apponāt os uē

VICES. PRIMVM

trículi debilitant, & si super uenas colli
posteriores (quas cadahin arabes uocāt)
infigant fortasse inducēt capitis tremorē.
Idcirco à cauitate occipitii parū de
scendere, & supra scapulam parū ascēde
re licet nisi forte sanguinis suffusioni vlt
tussi succurrere uelimus, tūc enim non de
bet ascēdi sed in suo loco dimitti. Appo
nere aut cucurbitulas super cahal. & inf
humeros sūmopeñ valet ad ægritudines
pectoris ex sanguine pēdentes, & ad san
guineā cōuulsionē sanguineūq; catarū.
Verū stomachum debilitat ac tremorem
cordis parit, porro si cruri superponant
iuramentū simile adferunt, qđ ex saphē
næ sectiōe haberi solet, sanguinēq; mūdi
ficant, menses ciēt. Mulieri insuper q̄ &
album colorem ac rarum habitū tenuem
q; sanguinē habet, magis expedit cucur
bitularum appositio super crura q̄ uenę
saphenæ icisio, præterea si super uertice
ac mediam caluariam infigantur ad deli
rium ac uertiginem, vt à nonnullis tradi
ditum

tum est, & ad tardam canitiē ualent. Sed hæc sententiā nō est omnino certa, nam in aliquibus corporibus, in aliquibus uero non id effici pōt, ut plurimū tamen solent canitiem accelerare intellectumq; lædere. Oculorum tamē morbis auxiliant & hoc est remediū præstantius qd' ex huiuscemodi infixione cucurbitularum haberi pōt, nā confert & ipsa scabiei palpebrarum tuberculis oculorum egressioniq; corneæ uel uueæ membranulæ uerum mentem offendit attonitum morbū obliuionem malas cogitationes morbosq; diuturnos parit, officit quoq; his qui suffusionem oculi patiunt, nisi forte tempus ad id faciendum cōmodum se offerat, nam sic fortasse nō nocebit. Ad hæc si sub mento iponātur dentibus, faciei, gutturiq; p'sunt caput ac maxillas mundificent, & si super coxendices, apponantur ad abcessum femoris eiusq; scabiē & tubercula podagra hemorroydas morbū elephanti ad uesicæ ac uteri uento sitatē

VICES. PRIMVM

dorsiq; pruritus satis ualeat. Qd si igne
 cū scarificatione apponantur maiorem
 uim obtinent ubi non sit flatuositas, sed
 q̄ sine concisione imponuntur uehemē-
 tius flatū frigidū dissoluūt eūq; in ea pte
 vel ubi cūq; existentē discutiunt. Appo-
 nēre quoq; eas super femore in intrinse-
 ca parte satis profunt ad testīū abscessus
 ac femorū tibiārumq; tubercula. Sed q̄ in
 posteriori femorū parte imponuntur ad
 abscessus qui in natibus orti sint ualent
 & si sub flexura genu admoveātur, con-
 ferūt tremori genu ex acris humoribus
 sub orto ac uitiosis abscessibus & ti-
 biarum pedū putridis uulceribus. Sed q̄
 super talos ponuntur, ad menstruorū re-
 tentionē & ad ægritudinē coxēdicis & po-
 dagræ ualeat, sed si sine scarificatione ap-
 ponātur, qñq; retrahūt materiā, a pte sui
 motus, ut cum māmīs infigunt ad sang-
 uinis mēstruorū profluuiū sistendū, nō
 nūq; tamē aponūtur, ut apostema profū-
 dū, extra euocet, ut medicamen perueni-
 at ad

at ad ipsū. Aliquādo vero vt apostema
ad aliquid mēbrū ignobilius sua vicini-
tate transferat. Nonnūq̃ adhuc admouē-
tur, vt mēbrum calefiat, & vt materia tra-
haat ad ipsum eius q̃q̃ flatus uentosi dis-
cutiātur, & quandoq̃ ut ad suū naturalē
locum mēbrum redeat, a quo dimotū est
vt sit in eo morbo quo intestina in scor-
tum dilabunt. Apponunt q̃q̃, vt dolor
mitiget, quemadmodū, cū infigunt vmbi-
lico ad difficilem dolorē intestini coli-
ac flatus uentris vētosos, vtriq̃ dolores,
qui tpe motus mēstruorū accidere solēt
& p̃sertim adulescētulis. Molliori q̃q̃
parti cruris infigunt ad coxendicū dolo-
rem. Coxæ uero ad luxationē & inā
bas coxas, si admoueāt valēt ad ipsa crus-
ra & femora & mariscas ad herniā patis-
entes & podagram. Appositio præterea
cucurbitularū super podicē trahit ab u-
niuerso corpore & a capite & confert in
testinis, corruptionem quoq̃ mēstruorū
sanat & corpus ab ea leuat, & vt aiūt, tria

VICES, PRIMVM

habent ex ea iuuamēta. Primum euacuatio, quæ ab ipsomet mēbro fit. Secundū q̄ substantia spiritus ita remanet itegra vt ad materiæ euacuationē, nō sequatur eius euacuatio. Tertium vero est q̄ nobilia mēbra nō euacuat, debet tamen cutis concisio profunda esse ut ex p̄terioribus partibus attractio fiat. Aliquādo insuper intumescit locus ubi infixa est cucurbitula, ita ut difficile auferat̄, tunc igit̄ pannum uel spōgiā aqua tepida madidā, quæ potius ad caliditatē declinet accipere debes, qua circuitus loci calefiat, hoc enim sæpiissime euenire solet ubi cucurbitulæ supra partis māmæ infigunt̄ ad profluuium mēstruorū ac sanguinis narium sistēdum, & ideo nō debēt super ipsāmet māmā firmari. Cumq̄ locus ubi infiguntur unctus fuerit statim apponi debent, nec tardādū ē imo cōfestim scarificāde sunt, prima quoq̄ appositio sit leuis facilis euulsionis mox gradatim tardet euulsionem ac moram, cui præterea cucurbitulæ
impo

impositæ fuerint cibis post horã dādus est, puero autē qui iam tertium egerit annum cucurbitulæ infigi possunt, sed qui sexagesimum egerit ānum nullo modo apponāť. Appositio præterea cucurbitularū nos tutiores facit ne materiæ ad partem inferiorem fluāt. Sed si ille cui apponunt fuerit biliosus grana malorum punīcorum eorumq; aquam & intubum & saccarum lactucā acetumq; postea assumere debet.

Caput xxii. fen quartæ, De hirudinibus.



Apiētes inde dixerunt aliquas esse hirudines natura uenenosas & ideo dānant magna habētes capita & colorē antimonii aut uirides & habentes in dorso ueluti fila coloris cæsii, & eas, quæ alicui serpētum generi assimilant, quoniā his omnibus inest uis uenerosa pariuntq; apostemata uel animi defectum, aut sanguinis profluuium, aut febrem uel lassitudinē,

VICES.SECVNDVM

aut ulcera intractabilia ac reiiciunt, quæ
in aquis cenosis uitiosissq; captæ sūt sed
eligi debent, quæ in aquis quibus lentis-
culæ supernascunt. Nec acceptes dictū
illorum, qui affirmāt esse uitiosas eas his-
rudines quæ in aqua in qua ranæ oriunt
genitæ fuerint. Sed quod ad colorē earū
attinet, præstantiores quidem sanguisu-
gæ sunt q̄ uiridem in dorso obtinent co-
lorem, & hñt ueluti duas líneas extensas
in earum superficie colore auri pigmēti
& q̄ sunt flauæ q̄ habent corpora rotūda
& quæ sunt coloris hepatis, & quæ simi-
latur locustis paruis & caudæ muris nō
absimiles, ac tenues p̄ua habētes capita,
nec eligant nisi, q̄ uentrē rubeum ac dor-
sum uiride habēt præsertim si in aqs flu-
entibus inueniantur. Hyrudinum præte-
rea attractio, maior fit ex itimioribus p̄-
tibus q̄ q̄ per cucurbitulas fiat, per diem
quoq; ad seruandæ sunt postq̄ captæ fu-
erint anteq̄ admouean, eas quoq; in cō-
trariam partem earum subuertere debes,
uteuo

ut euomāt & q̄cqd̄ in uentre cōtinent si
possibile fuerit egrediat̄. Mox exiguo
sanguine agnelli aut alterius id genus re
spergēdæ atq; alendæ sunt antequam ad
hibiantur, deinde capiāntur & spongia
muccore & sordibus repurgandæ sunt,
ea præterea pars cui admouēde sunt, de
bet prius nītro abluī frīctioneq; rubesce
re, postea uero cum eas inponere uolue
ris demergantur in aqua dulci & expur
gentur deinde defīgātur, facit præterea
eas auidius ahere si locus primo luto v̄
sanguine liniatur. Cūq; iam repletæ fu
erint & eas excidere desideras, tunc sale
aut cinere vel nītro, aut linteolo usto aut
cremata spongia vel lana aspergatur &
excident. Satiū autē est postq̄ excide
rint, cucurbitulis aliqd̄ sanguinis illius p
tis exhaurire, quo nocumentum ex mor
su earū inpressū extrahat̄, ceterū si sāguis
emanā nō desinat, gallæ cōbustæ ei pti
īponāt̄ aut calx, aut cinis aut mīrtus tenu
issime cōtrariū, aut aliqd̄ aliud id genus.

VICES. TERTIMVM

q̄ sanguinem supprimunt, q̄ omnia habe
at parata, qñ eas admouet. Cōfert autem
sanguisugarū appositio, morbis subcu
taneis ut serpigini impetigini & his si
milibus.

Caput xxiii. fen quartæ, Quibus nam re
mediis euacuationes astringantur.



Acuatio quidē astrigitur, uel
auertendo materiā citra eua
cuationem, uel euacuando cū
auersioe quoq; uel adiuuādo ipsammet
euacuationē, aut medicaminibus refri
gerantibus, constipantibus, aut glutinā
tibus, uel urentibus, uel deligatura. A strī
gimus autē euacuationem per reuulsio
nem sine euacuatione ut si sanguis ab ut
tero pfluxerit & eum retinere uolueris,
cucurbitulas super māmā defiges. Meli
or tamē diuersio est, qua dolor ticularū a
qua reuellit sedatur, ea uero reuulsio, q̄
fit cum euacuatione est, q̄ per sectionem
uenæ iecinorinæ fit, et uelut astrictio uo
mitus

mitus per alui solutionē, & hæc per uō-
mitū, & utrunq; ipsoꝝ p̃sudorē. Astri-
ctio ad huc fit, auxiliando euacuationi,
ut cum uētriculum & intestina exhumo-
ribus glutinosis lubricum lapsum faciē-
tibus, hiera purgamus, uentriculi q; oscu-
lum uomitu expurgare cogimur, ut ma-
teria, q̃ uomitum iā firmatum efficit ab-
scindat̃. Medicamenta quoq; frigida id
edificiunt, quia qđ frigidum est cōgelāt,
oscula q; stupida faciunt, ea q; āgustiora
reddunt. Medicamenta autem stiptica
ideo id faciunt quia materiam cōprimūt
meatus q; stipant, sed glutinatiua medica-
mina, p̃pterea q̃ in osculis meatuum ob-
structionem pariunt, q̃ si calidā exiccan-
tia q; fuerit, fortius id efficient. Medica-
mīa uero crustā generantia, ideo id effici-
unt, quia ea crusta sup̃ ipsum meatum ue-
lut op̃culum manet et claudit, eum q; stri-
cte herere facit, uerum adfert secum peri-
culum, ne scilicet crusta decidat, et latior
reddat̃ meatus. Sunt præterea aliqua in-

VICES, TERTIVM

crustantia, quæ astrictiuam facultatē hñt, ut Myſi, aliq̃ uero nō, ut calx nō exticta ubi autē crustā diutius herere desyderamus, astringentibus crustificis tunc utimur. Aliis uero ubi citius crustā exciderē cupimus, fit adhuc retentio per ligaturā, partim claudendo meatū & ut omni conatu si opus sit claudatur ueluti ligamus cubitum, ubi medicus per errorem, arteriam pro uena iecoris secuerit, pti replendo ora uulneris. re, uiam claudente, qua uacuatio fit, ut si repleatur osculum uulneris pilis leporis dicimus igiturq̃ si sanguis pfluuium ex reclusionē orificiorū uenarum fiat, utiq̃ medicamentis astringentibus opus est, ac oscula earum cōprimere. At si ex eruptione id fiat, tūc astringentibus simul & glutinātibus opus est ueluti terra lenia. Qd̃ si ex erosionē pfluuium accadat, his q̃ carnē gingnūt mixtis cum detergentibus nederi debet.

Caput. xxiiii. fen quartæ, Quo nā pacto obstructiones curari debeant.

Obstruct



Instructiones qđ fiunt vel ab humore crasso, uel ex lentis humoribus aut multis, qđ si ex multis fiant humoribus, nulla alia cōcurrente causam tunc ad auferēdā eorum lāsiōnē satis erit, uel sanguinis mīsiōne uel purgatiōe eos educere, at si ex crassus, tunc medicamina dissoluētia, q̄ abstergunt administrari oportet. Si uero glutinosi fuerint humores & præcipue tenues, tunc incidentia medicamina necessaria sunt, ne te lateat qđ iter sit inter crassum & lentum. Differunt enī inter se se uelut lutum & gluten liquidū. Crassū enī dissoluētibus eget attenuē & facile expellat, glutinosū uero icidētibus ut inter ipsū & id cui adheret sepatio fiat ut ab eo expurge et eius ptes icidāt, nam glutinosū suo lētore, ac suarū ptiū adherētia, obstructionē parit. In dissoluēdo præterea crasso, duo cōtraria sūt obseruāda alterū. s. ne fiat r̄solutio ita imbecillis ut raritatē materiæ, eiusq̄ molē augeat.

VICES. QVARTVM

Citra resolutionem, augendo adhuc opilationem. Alterum uero ne ualida fiat resolutio. Cuius tenuis portio in uapores, crassa uero in lapidem uertat. Cunctæ ualida indigebis dissolutione adiuua eâ leui mollificatione, q̃ fiat medicamē nō crasso, habente calorem moderatum, ut ualeat penitus dissoluere, id qd̃ facit opilationem. Inter obstructiōes præterea, difficilior quidem est, q̃ in uenis fit, deterior autem hac, q̃ in arteriis, deterior adhuc est, q̃ in principibus partibus fit. Ad hæc medicaminibus recludētibus satius q̃dem est admiscere aliqd̃ uim astrictiuā & attenuatiuam habens, qm̃ illud astrictiuum, grauitatem attenuātis corrigit.

Caput xxv. sen quartæ, De cura abscessuum.



Postematum, q̃dam sunt calida, quedam frigida mollia, quedam frigida dura, q̃ iam a nobis numerata sunt. Eorum autem causæ,

causæ, uel sunt extrinsecæ, uel præcedētes, intelligo aſit per præcedentes ueluti plenitudinem, p̄ exteriores uero, ut uulnus, caſum, ictum, ac morſum, porro qđ ex cauſis exteris fit uel cū corporis plethoria, uel cum humerum moderātia accidit. Si cum corporis plethoria antecedentes & exteriores cauſæ concurrant p̄fecto uel in uicinis partibus iſpis principibus mēbris ad quas fit tranſmiſſio, id fiet. uel nō. qđ ſi nō, tunc in principio ni hil reſoluens eis admoueri debet, ſed mēbrum impellens, ſi adſit, corrigi debet uſq; uniuerſum corpus corrigatur. Si hmōi apoſtema nō habuerit ſingulare mēbrū admouendo ei qđ cūq; repellat, & ad oppoſitam partem retrahet & aſtringat. Et fortalle fiet tractio ad oppoſitam partē illius mēbri locati in parte oppoſita, per dimotionem aut ſi aliqd̄ grauæ pondus ferat, nā ſæpiſſime trahitur materia a manu in qua ē abſceſſus, ſi altera, aliqd̄ grauæ pondus feratur per horamq; illud re-

VICES, QVINTVM

tineatur. Ea uero, q̄ uim astrictiuā hñt, in calidis quidē apostematibus debent esse exquisitē frigida. Sed in frigidis, mixta his, q̄ uim obtinent & calidam & astrictiuā, ut ē scheniāthos, & unguis odoratus, seu cōcula indica (quā blactā bisantiā uocāt.) Accedēteaūt maturatione, minus astrictiua applicabis, quibus dissoluentia admiscebis, donec peruenerit ad uigorē tūc enim nequis portionibus misceri debēt. Sed dū inclināt resoluētibus & molliētibus uti sat erit, ea uero q̄ frida ac mollia dissoluūt apostemata uī exiccatiuam ac aridam habere debēt, q̄ q̄dem vis plus in calidis repiri solet. At apostemata q̄ ab exteriori cā ortū hñt, nec ulla adest humorē repletio, debent oīno in principio, mollientibus & resoluētibus curari. Sed nō eo mō, quo curasti primū genus. Verū si illud mēbrū, qd' apostemate laborat, fuerit ueluti excretoriū alicuius principis, ut sūt loca adnosa colli et apd' aures ipsius quidē ceribri, ascelle uero cordis, iuguinaq̄

iguina & hepatis, tunc nullo pacto debet
eis applicari, qđ repellat, non quasi hæc
non sit vera curādi ratio eorū apostema-
tū, imo hoc est vere præsens remedium
illorū apostematū. Sed nolumus ea apo-
stemata sanare, imo cupimus ea augere
materiāq; ad ea trahere, nec timemus ad-
dere læsionē illi p̄ticolæ cū principi opi-
tulari q̄ramus, nā si materiā r̄uelleremus
nūq; sine formidie essemus, qn materia
ad nobile mēbrum perueniret vnde irre-
pabile subsequetur incōmodū, nam nos
præeligimus mēbrum lædi ignobile, ubi
nobili succuretur. Immo nos studemus
trahere materiā ad mēbrū ignobile, & ut
in eo apostema oriatur, siue cucurbitulis
siue emplastris calidis, vim attractiuā ha-
bentibus. Et cū hæc vel alia apostemata
suppurāt, & præsertim quæ sunt in locis
cauis, fortasse sponte, vel auxilio matura-
tiorū remediōrū disrumpētur, & for-
tasse maturare ac rumpere simul conabi-
tur, Maturatio aut perficit, his quæ oppi-

VICES. QVINTVM

latiuam ac glutinatiuā habent uim addi-
tam calefactoriæ, quibus ipse calor reti-
neatur. At si quis huiusmodi maturati-
uis remediis uti uoluerit, debet animad-
uertere, utrum calor innatus sit imbecil-
lus & mēbrum tendat ad corruptionem
tunc enim ea quæ uim habēt oppilatiuā
& glutinatiuā amouere debet, & uti ape-
ritiuis ac profunda scarificatione, mox res-
olutiuis & exiccatiuis, ut adhuc in parti-
cularibus libris, sermō nobis cōplebitur
Sepe præterea apostema est profundum
ita ut cogamur trahere ipsum ad partem
cutis etiā cucurbitulis ignitis. At in du-
ris apostematibus quæ terminū uigoris
transierint cōueniens remediū ac regula
est, uti mollificantibus remediis, quādo
q̃ his quæ parū calefaciant & exiccent,
ne præ nimia dissolutione, quod crassius
est duritiem lapidis assequatur. Immo id
totum dissolutioni paretur, mox dissolu-
tio augeatur. Quod si postea uerearis, ne
ex dissolutione, quod residuum est, in la-
pidem

pidem uertatur, reuertere iterū ad molli-
ficantia, & sic iugiter pcedas donec par-
tim mollificādo, partim dissoluēdo uni-
uersum apostema cōsumes. Apostemata
uero tumida (quæ oedemata uocantur)
curantur medicaminibus habentibus uā-
calefactoriam, cū tenui substantia, ut fla-
tus dissoluantur, meatusq; exigui dilatē-
tur, nam horū apostematum tumidorum
causa est, crassus flatus ac meatuum ob-
structio. Oportet adhuc studere, ut amo-
ueatur, ea materia, quæ uaporem gignit
flatuōsum. Sunt præterea nonnulla apo-
stemata ulcerosa, ut formica deambula-
tiua, quæ quidē remedia refrigerātia ex-
poscunt, eiusdem generis sunt apostema-
ta inflāmata (q̄ phlegmone uocantur) Ac
non debēt humectari, & si ipsi apostema-
ti deberetur humectatio. Immo exiccen-
tur. Quoniam in his Accidēs uicit iam
causam. Est autem accidens ipsum ulcus
qd' affuturum timetur, vel quod iam ac-
cidit. Vlceri enim cura exiccatiua debet

VICES. QVINTVM

tur, cui nihil noxium magis ipsa humectatione. In intrinsecis uero apostematibus, debet materia minui per uenæ sectionem & purgatiuum medicamen. Debent etiam qui apostematibus hisce uexantur balneum uinumque & motus corporeos ac animales immodicos ut est iracundia & id genus alia euitare. Deinde iter initia debet uti his, quæ sine molestia repellere ualeant præsertim si id membrum fuerit quale est uentriculus, & iecur, tempore autem quo dissoluentia remedia, conueniunt, non debent deesse tibi stiptica odora, ut in præcedentibus sermonibus iam te admonuimus, et iecur atque uentriculus inter cætera membra, his stipticis magis quam pulmo indiget. Ea uero remedia, quibus utimur, ut alium leniant, debent esse medicamina, quæ vim maturandi & cum ipsis apostematibus conuenientiam obtinent ut hortense solanum & cassia fistula. Valet autem ipsum solanum, ex propria natura, ad dissoluenda calida apostemata intrinseca, & qui his laborant abscessibus

scellibus, non debent vti nisi tenui uictu
& dum accessio nō adsit, si accessionē ha
buerint, nec inter initia, nisi forte urgē
te uehementi ībecillitate. Et qui aposte
ma uiscerū sīl' cū defectu viriū patiat' is
ad interitum accedit cum vires, cibo tan
tum excitentur nihil autē magis lædit q̃
cibus. Quod si apostemata dissoluantur
bene est. Sed si disrumpantur, tunc q̃ de
tergant bibi debēt, ut aqua mulsa, & aq̃
ex saccharo, mox, quæ sensim maturēt, cū
his q̃ vim exiccādi hñt assumi debēt. Tā
dē q̃ exiccent satis erunt. Sed hæc ex acte
cognosces ex libro, qui p̃tiales continet
morbos. In apostematibus præterea in
ternis, q̃ sub ventre existunt, cōmittit' er
ror, cū forte nō sint apostemata sed rop
tura, & tunc eorum apertio erit timoro
sa vel fortasse erit apostemata internum
qd' non est in peritoneo, sed in ipsomet
intestino, & tunc apertio eorum non sine
discrimine erit.

Caput xxvi, sen q̃rtæ De Apātū apertioe.

K iij

VICES. SEXTVM

SI quis aliquem abscessum aperi-
re uoluerit debet scissura, ru-
gas illius membri imitari, nisi
id mēbrum fuerit frons uel ali-
ud simile. Nam si in eo scissura secundū
rugas fieret, incideret musculos frontis,
& supercilium caderet. Verum in mem-
bris in quibus rugæ contra ordinem uil-
lorum musculi procedunt contrariū fiat
Debet igitur qui incidit, scire artem se-
candi neruos, ac uenas & arterias, ne ob-
erret & aliquid horum incidat, & medi-
camenta sanguinem ad stringentia apud
se parata habere ac emplastra dolorē mi-
tigantia, & instrumenta ad id idonea, ha-
beatq; secum aliqua, ut sunt medicami-
na Galeni, & uelut pilos leporis &
telas (seu stamīna) arānei & album oui,
& urentia omnia phibent sanguinis flu-
xum si accidat, siue ex errore siue ui ad
id inductus quis fuerit, & habeat penes
se medicamina mollientia. Et cum aperi-
tur abscessus & extrahitur, id qd' intus
erat,

erat, non debet admoueri ei, oleum neq;
aqua neq; linimentum in quo sit oleum,
vel seuum abundans ut est unguentum
basilicon sed debet apponi uelut linimē
tum ex chalcitide, quod fiat cū eo idinga
nūis, & supra ipsum inponat spongiā
madefactā ex uīno austero.

Caput xxvii. fen quartæ, De mēbri cor
rupti curatione eiusq; sectione.



Vm aliqd' membrum corrup
pitur ob aliquā malam tempe
raturam in eo existentem, cum
materia uel sine materia, & nō
suffecerit sacrificare, aut linire his quę ip
sum corrigāt de quibus facta est mentio
in libris particularibus, tunc caro corrup
ta quę in eo est omnino auferatur & sa
tius est id sine ferro fieri quatenus datur
quoniam ferrum si fortasse tetigerit mus
culorū fibras & arterias lædet eas. Sed
si id non sufficiat, & corruptio iam deue

VICES. SEXTVM

nerit ad carnem, tunc necesse est ipsum
 secare, & locum sectionis oleo feruente
 urere. Sic enim a uehemētia malitiæ ei-
 us nos tutiores reddit, fluxusq; abscinde-
 tur, ac super locum scissum caro & cutis
 aduentitia dissimilis, simillima tamē sua
 duritiæ, ipsi carni oriatur. Et cum deue-
 neris ad incisionem, debes intromittere
 stylum, quo fit tentamentum, & in circu-
 itu ossis ipsum circumducere dum inue-
 nias sanam unionem (nam ubi dolor au-
 getur ex styli ductu) inibi quidem sani-
 tas terminat̃, sed si locus ille relaxus fue-
 rit et eius unio imbecillis, tunc illud seca-
 ri debet. Quandoq; præterea perforabis
 id quod circumdat os, quod secare cupis
 ita ut terebellis circumdetur et rumpatur
 feretur ue. Quādoq; uero serra ferrabis.
 At cum id efficere uolueris, fac ut inter-
 mediet, aliquid inter instrumentum quo
 inciditur terebellum ue et ipsam carnē,
 ne dolorem adferāt. Et si super os quod
 secare intendis fuerit ueluti arteriæ pro-
 minētes

minentes non herentes inter se nec speretur eas in rectam habitudinē reduci posse. Immo timeas ne id qđ in eius circuitu est corrūpatur, tunc caro debet ab eo remoueri uel scissione uel deligatura aut extensione, ducendo ad oppositam partem uel aliqua alia industria, ad quam ipse uisus te diriget, & si ibi aliquod membrum nobile adfuerit, tunc inter ipsum & illud os aliquid intercipi curabis, uelut septis, ex frustis pannorum, ut his ab eo distet deinde seca. At si huiusmodi os fuerit, uelut os coxe & magnū musculis Arteriis uenisq; proximū, eius quoq; corruptio immodica, tūc medicus debet ab eo negotio se abstinere.

Caput. xxviii. fen quartæ, Decuratione
solutionis vnionis aculce
rum generum.

VICES. OCTAVVM



Continuitatis solutio magnorum quidem membrorum, æquatione & cōuenienti deligatiōe quæ in arte ligandarum fracturæ dicta sunt & ad huc suo loco tibi dicetur curatur. Mox quiete uictuq; glutinatio ex quo callum seu porū carnosum gigni sperabis, & utrāq; partem fracturæ maxima hessione unire facias & superponas bracteas quas super unionem partium uasis ærei, fabri ærarii, solēt apponere labiaq; fracture uia stringas atq; impleas, nam falsum est posse coalescere os, præsertim in ætate adulta nisi hac ratione, quoniā non potest ullo pacto cōglutinari. De curatione tamen fracturæ adhuc faciemus completum sermonem in singularibus tractationibus. Curatio uero solutionis continui, q̄ in mollibus contingit membris tres cōplectitur intentiones; si causa fuerit fortis. Prima est abscindere id quod p̄fluit, sistereq; materiā eius si festinet ut noceat. Secunda est scissionē

scissionē unire medicaminibus ac cibis
cōgruis. Tertia uero est putredinē phis
bere, quod ad fieri potest, quod si his tri
bus unum desit, inspicere reliqua duo.

Quot autē modis sistatur id quod pflu
it iam nosti. Vnio uero fit cogendo in u
num labra ulceris, si in unū duci possint
exiccantibusq; ac glutinantium assump
tione. Nec te lateat intentionē curatiū
ulcerū esse ipsam exiccationē. Quod si
ulcus fuerit purum exiccetur tātum, sed
si putridum adhibeantur medicamenta
acria corrodetia ut ex chalcitide & mysi
et arsenico & calce & si nō ualeant, tunc
necesse est deuenire ad ignem. Medica
mentum autē quod ex flore aeris & cera
et oleo conficitur moderatum est in hoc
negotio, flore enim aeris mūdificat oleo
uero & cera mordicatio imodica tollit.
Dico adhuc q; omne ulcus necessario est
uel solum et ipsum per se, aut cōpositum
Solum autē si exiūt fuerit nihilq; i eius
medio erosum fuerit, tunc labra debent

VICES.OCTAVVM

uniri, ipsumq; fascia iuolui, cū maxima
tamen animadsiōe ne aliquid olei inter
ipsa labra ītercipiatur aut pulueris īspe
gatur. Hæc enim prohibent ipsa uniri.
Identidem fieri conuenit in magno ul
cere cuius substātiæ nihil desit & partes
altera alteri cōiūgi possit. At ulcus mag
num quod non potest uniri siue id fue
rit scissura aut capacitas, plena sanie ex
qua aliquid substātiæ ipsius membri de
perditum fuerit, eius quidem curatio est
exiccatio. Sed si id deperditum, cutis fue
rit sola, tunc quod cutē obducat expos
cit & id quidem uel per se, & tunc astrin
gentibus, aut per accidens, & tunc cali
dis uti oportet, parum tamē, sitq; id ustū
ex mysi, & chalcitide. Hæc enim magis
faciunt ad exiccationem & magis crustā
gignūt. Qd' si imodica hæc essent corro
derent, ulcusq; augerent. At si qd' deper
ditū est, fuerit caro sola, ut in ulceribus
profundis, non festines cicatricem obdu
cere. Immo primo debes in generāda car
ne

ne studere. Gignūt at carnē, q̄ primū or-
dinem exiccādī nō multū transgrediunt
sed circa hoc, q̄dā cōtemplari prius opor-
tet, primū tēperamētū radicale ipsius pti-
culæ tēperamētū q̄ ulceris. Nam si illud
mēbrū fuerit tēperaturæ ualde humidæ
ulcus uero nō. Tūc exigua exiccatio in
primo uidelicet ordine sat erit, qm̄ mor-
bus ipse, nō multū distat a natura mēbri.
Sed si mēbrū fuerit siccū & ulcus uehe-
mēter hūidū, tūc q̄ in secūdo & tertio or-
dine exiccant sūt necessaria, ut sue tēpe-
rature restituat. In temperatis uero tēpa-
ta sūt opportuna. Ad hæc et uniuersi cor-
poris tēpamenū inspiciere oportet. Quo-
niam si corpus imodice siccum fuerit, &
illud membrū qd̄ est auctū in hūiditate fu-
erit tēperate humiditatis incōparatiōe ad
corpus tēperatū, tūc debet æqualiter exic-
cari, itidē si corpus fuerit i humido auctū
et mēbrū declinet ad siccitatē. Sed si simp-
lex excessū ægrediant v̄l egressio fiet ad hūi-
ditatē, tunc maior exiccatio cōuenit & si

VICESI: OCTAVVM

ad siccitatem minor exiccatio est neces-
 saria, porro ipsius medicaminis exiccati-
 ui facultatem contēplari oportet, nā li-
 cet, exiccantia medicamenta q̄ generant
 carnem non adhibeantur, ut exiccationē
 ita ualidam efficiant, qua phibiatur ma-
 teria effusa, q̄ est apta carnem in mēbro
 generare, ut ea quæ ad generandā carnē
 non sunt ad inuenta sed ad obducendam
 cutem, desiderantur tamen ut magis de-
 tergant & abluant, q̄ q̄ exiccant, & quæ
 quidem ut sigillent & cōglutinēt admo-
 uentur, & omnia medicamina quæ citra
 mordicationem exiccant, inter carnē p-
 ducentia ascribuntur. Quoniā omne ul-
 cus in loco non carnosō, nō est aptū cito
 sanari, Itidem neq; orbiculare. In medi-
 caminibus præterea exiccātibus & astrin-
 gentibus, quæ ad curationem ulcerū in-
 ternorum administrātur, debent admissi-
 ceri, quæ detergant, ut mel, ac ea quæ pro-
 priam respiciūt pticulam, uelut quæ uris-
 nam cient ubi instrumentorū urina accō-
 modatorū

modatorū ulcera curare tētamus, sed cū
cicatricē ducere cupimus, tunc medica-
minibus utimur, quæ cum sua astrictiōe
habeant adhuc exiccare & conglutinare
ut est terra lennia, (quā sigillatam uocāt)
Scias adhuc q̄ multa sunt quę ulcus sana-
ri prohibent, ut est membri intemperies,
idcirco oportet eius correctiōi studere.
Mala quoq̄ sanguinis temperatura, qui
ad ipsum uadit idē prohibet. Quare his
qui optimum humore gignunt corrigi
debet. Multitudo adhuc sanguis qui ad
illud fluit ipsumq̄ humectat, id quoq̄ ef-
ficat, cui succurrendum est euacuatione,
& uictus attenuatione deambulatiōeq̄
si fieri potest. Ad hæc ossis ei subiacētis
corruptio, idem facit emittendo saniem,
quod quidem uitiū nullum habet reme-
dium, nisi rectificatione illius ossis eius
q̄ abrasione si fieri potest, ut abrasio cor-
ruptionem tollat. Ablationeq̄ atq̄ secti-
one, sæpissime præterea cogitur qui ulce-
ra sanat, ut ferat apud se emplastra trahē-

VICES. OCTAVVM

tia ossis fragmenta, habeatq; instrumenta quibus ea educat, alias enim ulcus sanari impedirent, porro ulcera cibo indigent ut opituletur eis sed eius minutione, ad abscindendam materiam saniei. Verum he due necessitates, inter se differunt, quoniam sanies vires debilitat propterea roboratio ne indigent, at ubi multiplicatur, inedia indiget, quo circa medicus debet esse huius negotii rector. Cumq; ulcus fuerit in principio & incremento non debet hanc ingredi, nec aquam calidam tangere, quoniam traheret ad ipsum quod apostema augeret, at si iam ulcus quieuerit & sanies generata fuerit, tunc forte id licebit. Omne praeterea ulcus, quod citius iusto claudit dum in suprema parte consolidatur, est in via ad caecrenam, inspicere igitur oportet spem saniei laborumque ulceris colorem, quod si sanies multiplicetur non multiplicato cibo, illud est ipsa maturatio. Nunc vero de curatione rupture differamus & dicamus, quod cum ruptura sit solutio continuitatis

tatis

tatis profunda sub cute iccirco ualentio-
ra medicamēta requirit, q̃ q̃ in sūmo cor-
pore existit, sed qm̃ sanguis uberrime cō-
fluit ad eam, iccirco dissoluenti indiget
medicamina quod quidē non debet imo
dice siccarī ne tenue dissoluatur & cras-
sum in lapidem conuertatur, facto autē
officio ipsius dissoluētis, glutinatorii us-
us necessarius est, ne sordes medie ulce-
ris coitum īpediant, & in lapidem cōuer-
tantur, mox qualibet leui de causa putre-
scant, vel euellantur, & solutio cōtinui-
tatis redeat. At si ruptura pfundior fue-
rit, debet particula ipsa scarificari, ut me-
dicamen magis penetret. Ruptioni prae-
terea cum leui fractiōe fortasse uenae se-
ctio pro cura satis erit. At si ruptio cōtu-
sioni adiūcta fuerit, tūc cōtusio debet cu-
rari medicamibus cōtusiōi idoneis, & si
contusio fuerit magna curet exiccātibus
et si exigua uelut pūctura acus, tūc eā na-
turæ cōmittemus nisi fuerit uenefica īte-
rimens, vel magno cruciatu dolorem af-

VICESI: OCTAVVM

ferns, aut tetigerit neruum, vnde aposte-
ma & pulsum oriri uereamur. In fractu-
ra uero ossiũ sufficit leuís deligatura nõ
dolorosa, & super ponere medicamenta
ad fracturas ppria. In casu uero uel ictu
aliis id gñs, necessaria est uenæ apertio
cõtraria parte facta uictusq; tenuitas car-
nium cuitatio, & id genus aila, linimen-
tis quoq; ac potionibus ad id iam in par-
ticularibus cõmētariis inscriptis uti par ē.
De soluta autem continuitate q̃ mēbris
nerueis ac ossibus accidit postea fiet ser-
mo ubi de particularibus rebus tractabi-
tur.

Caput xxix. fen quartæ, De uisione.



Stio quam cauterium uocant
est efficacissimũ remediũ, qđ
ualet ad prohibendũ expãsi-
onem corruptionis & particulam cuius ī
tēperiem corrigere cupimus, roborandã
materiasq; corruptas mēbro infixas dis-
soluendas, Sanguinisq; profluuium sup-
primen

primēdū. Inter metalica at̄ instrumēta ignita, qbus adustio fit prēstātius est aurū, locus aut̄ ubi cauteriū fieri debet uel sensibus deprāhēdit̄, ita ut ustio manifeste appareat ubi nam fiat, uel locus is pfundus erit intra imam ptē alicuius mēbri situs, ut est nasus & os & podex & id gñs alia, ubi oportebit aliq̄ formula ueluti uagīa uti, supra quā inclinet̄, ut est illud gñs terræ samīæ (q̄ Aster uocat̄) ab arabibus talk. & ut gñs illud chimoleæ terræ, q̄ rubrica est, uulgo sinopide (& ab arabibus magra d̄r) hęc igit̄ debet aceto pfundi, mox panno inuolui & aq̄ rosacea aut aliquibus succis ifrigidari, illaq̄ formula in illum meatū, introducat̄, ita ut locū urendū ābeat, deinde ferramētū ignitum intromittat̄, ut locū pertingat et nō ledat qd̄ ī circuitu eius existit, pręferim si ferramentū illud urens tenuius fuerit, cauitate formulæ, ne eius formulæ latera interna cōtigat, caueat pręterea qui urit ne ferramento illo ignito, usq̄ ad neruos, &

VICES. NONVM

tēdines ac copulas pertrāseat, Qd' si uisti-
o ad sanguinē sistēdū fiat, tūc ualidior es-
se debet ut crusta, q̄ gigniū pfundior ac
crasor sit, ne cito decidat, nā ubi sanguis
pfluat, si crusta ceciderit, maior inferret
nocumētū q̄ prius. At si ad tollēdā carnē
corruptā uisionē feceris et terminū inco-
lumē deprāhēdē uelis. Scias eū esse ubi
adeſt dolor. Et fortasse cogeris una cum
carne os, qd' sub carne existit uterī, & uisti-
onē infigere, donec tota eius corruptio
tollat. Si uero id qd' urit, fuerit ut calua-
ria, tunc caue ne cerebrū ferueat, et ne mē-
branæ ipsæ cōuellāt, alias uero non uere
arīs integre urere.

Caput. xxx. fen quartæ, De dolorū miti-
gatione.



Aufas dolorū sub duplici gñe
cōtineri, uidelicet subita tptu-
re mutatione, solutioneq; cōti-
nuitatis, iam nostri, nec te latet
has diuisiones tādē deduci vel ad malam
tpturā calidā vel fridā v'siccā sine mā aut
cū materiā hūorosa aut flatuoso spū, aut

apostemate, mitigat̃ igit̃ dolor his q̃ con-
traria sũt illis causis, q̃ aut̃ pacto fiat con-
trarietas, cuiq̃ carũ, etiam nosti. didicisti
præterea q̃l̃r curet̃ mala t̃patura ac ap̃a,
oĩs adhuc dolor q̃ ualidior sit, interficit̃
qd̃ ac priõ corp̃i fr̃iditatem rigoreq̃ ad-
fert, mox minor reddit̃ pulsus, dinde pe-
nit̃us amittit̃, postremo tãd̃ morit̃ eger,
porro qcq̃d̃ dolorẽ mitigat, vel t̃paturã
ĩmutat vl' materiã dissoluit aut sensũ stu-
pidũ reddit, ea vero q̃ molliũt̃ inter faci-
le dolorẽ soluentia locant̃, ut anethũ & li-
ni semẽ & sertula cãpanica (q̃ melilotus
uocat̃) & anthemis) q̃ chamemeleon uo-
cat̃) & apii semẽ. Amigdalęq̃ amaret, &
q̃cũq̃ priõ ordine sũt calida, & præsertĩ
q̃ aliquam glutinatiũam uim habent ue-
lut gummi quod arbor prunorum resu-
dat, & amyllum, & genera cerusæ, & cro-
cum, & ladanũ, althea, amomũ, & bras-
sica. Rapũ eorũq̃ decoctũ, adipēs, & hy-
sopi ceratũ (qd̃ hũida hysopus uocat̃) ac
olca q̃ in lib. cõpõnũ medicaminũ tradi-

ta nobis sūt, ac solutiua & purgatiua me-
dicamina q̄cūq; fuerit huius sūt gñis por-
ro ea q̄ mollificāt, debēt post eūones ad-
ministrari, si eūatio cōuenerit itidē & q̄
apostemata maturant uel apiūt. Inter ue-
hementer soporatiua primū ē succus pa-
paueris, seu meconion (qd' opiū uocat)
& mādragoras radicūq; ipsius cortices,
& papauer, hyos cyamus, & cicuta, & so-
lanū sōniferū, lactuca, & ex horū sūma ē
nix & aqua frigida. Sæpiissime præterea
cōmittit̃ error in doloribus q̄ ab extrin-
secis cānt̃, ut a calore uel frigiditate, aut
eminētia puluinarīū, aut in cōmodus de-
cubitus aut casus dū ebrius est & alia si-
milis q̄rū cā intrinsecus querit̃, & sic de-
lingt̃, quappter oportet id nō ignorare,
nec latere utrū adsit plethoria necne, &
sciat̃ utrū adsint cāe ipsius plethorię iam
notę. Et fortasse cā extrinsecus proueni-
et, & iā intrinsecus inpresserit, uelut q̄ a
quā biberit frigidā, unde uehemēs oriet̃
dolor inptibus uētriculi atq; iecinoris.

Et

Et multotiens est necessaria aliqua magna euacuatio uel aliquid aliud magnum præsidium, quoniam tamen sufficit balneatio & magnus sonus, ut si quis assumpserit aliud quod calidum unde dolore uehementi caput crucietur cui tamen potio aque frigidissime sufficiens remedium erit fortasse tamen id quod speramus dolorem remouere, tarde imprimi suam actionem ita ut eger non possit dolorem ferre usque ad illud tempus, ut est euacuatio materiae retentæ in uillis intestiorum efficiens dolorem intestini colici, aut erit uel locis impressionis, sed maxime ledens, ut est soporatio illata in pectus dolore colico affecta, medicamentis id facientibus, ita ut medicus de hoc negotio maxime erit perplexus. Idcirco efficacissima coniectura præditus esse debet, ut cognoscat quod nam horum duorum temporum diutius perdurare possit utrum uirium uel doloris constantia, acuter nam horum affectuum magis lædet, utrum dolor ne, an nocumētum, quod ex soporificatione oriri suspicamur, ut quod conuenientius

VXX TRICESIMVM

est preponat, forte .n. si dolor remāserit
interimet suo uigore & magnitudine.
Sed stupor fortasse non interfeciet, quā
alias ledat. Immo fortasse poteris eius
nocumētū corrigere, & iterum medica
mine condecenti poterit curari. Verum
cōstitutionē soporifici medicaminis ei
usq; q̄litatē inspicere oportet, ut leuiori
utamur, illudq; cum suo correctiuo r̄me
dio (qd' antidotum uocant) cōponemus,
nisi adfectus ita esset uehemēs, ut maxia
īdigeret stupiditate, vel forte pticula illa
adfecta nihil timebit stupefactionē, si in
ea administret, qā n̄ inferet inde maxīm
nocumētum ut stupefactiuū medicamē
admoueat, uel forte erit tuta potio medi
caminis stupefactiui, ut sit in dolore ocu
li, nam minus hæc lædit oculum, q̄ lini
re ipsū. Et forte poterit facile corrigi no
cumentum pueniens ex potatione illius
in aliis mēbris. At in dolore colī intesti
ni, crescit lesio, qm̄ materia augebit frigi
ditatē & cōgelationē ac duritiē, Medica
mina

CAPVT LXXXVI

mina præterea stupefacientia qñq; miti-
 gant dolrē, ppter ea q; dormire faciunt,
 nam sōnus iter cās doloris mitigatiuas
 refert, præferim si secum inedia associet
 in dolore materiali, stupefactiua uero cō-
 posita quorū uis medicamibus correctis
 uis refigit tutiora sūt, ut ē medicamē phi-
 lonium, & trocisci noīati de tribus cōpo-
 sitio uocata diatrīton. uerum minus stu-
 pefaciunt, et recentiora eorum uehemen-
 tius, antiquiora uero nihil, media v̄o me-
 diocriter stupefaciunt. Dolorum præte-
 rea aliqui sunt ualidissimi qui tñ facillie
 curant̃ in quibusdā tpibus ut sunt qui ex
 spiritu flatuoso ortū hñt. Immo qñq; mi-
 tigañ ac eis sat ē irrigatio aquæ calē su-
 perfudisse, uerum illud remediū unū mi-
 nat̃ pticulum, uidelicet ne si forte cā do-
 loris fuerit apostema et existimat̃ esse uē-
 tosus flatus cui si in initio præsertim su-
 perfundat̃ aqua calida, augebitur nocu-
 mentum. Immo fortasse nocebit et in fla-
 tuoso cum nequiuert flatum dissoluere,

TRICESIMVM

& expansio q̄titatis eius inde augebitur,
 fomentationes etiā q̄ calefaciunt, uen-
 to sitatē curant, & inter huiuscemodi me-
 dicamina prāstantius est qđ exiccat, ut
 milium nisi forte illud mēbrum id nō su-
 stinuerit, ut oculus qui quidē inpositio-
 ne pannorum calidorum calefit, fiunt ad
 huc fomenta oleo calefacto, ualidius prę-
 terea fomentum est si farina erui ex ace-
 to cōquatur & exicceť deinde fiat ex ea
 fomentum. Ad id uero inferius remediū
 est fursuris decoctum, uapor prāterea sa-
 lis mordet. milii quidem eo prāstantis-
 or uerum debilior est, qñq; adhuc sit fo-
 mentum ex aqua per uesiculā, qđ quidē
 & tutius et lenius est. Verum nisi animus
 aduertat. efficeret qđ paulo ante dictum
 fuit Ad hæc cucurbitulæ ignite sunt hu-
 ius generis maxieq; dolorem seādt flatur-
 osum, & si iterum repetantur tollē pe-
 nitus dolor, uerum ex huiuscemodi me-
 dio potest accidere qđ supra dictum
 est, sedatur prāterea dolor leui deambu-
 latione

latione ac diuturna, propterea qd' mollit
Itidem & tenues adipēs satis noti, oleaq;
iam nobis enarrata, porro suauis melo-
dia musicalis, præsertim que somnum
induxerit, ac his quæ letitiā afferunt uas-
care, ualidissimum mitigant dolorem,

Caput xxxi. fen quartæ,



I duo simul concurrant morbi
ab eo incipiendum est qui ha-
bet unum trium horum pprio-
rum, primum est, ubi nō possit
secundus morbus curari nisi curetur ip-
semet, ut apostema & ulcus si coniungan-
tur. primo enī apostema curabimus do-
nec mala intemperatura quæ illi coniun-
cta est auferatur, qua existenti non pote-
rit ulcus curari, mox ulcus ipsum cura-
bit, secundum ubi alter alterius adfectus
fuerit cā, ut cum opilatio & febris coeāt.
prius enim opilationem, secundo febrē
curabimus, nec febrē timebimus ubi opi-
lationē hisq; calefaciunt aperire uelimus

TRICESIMVM PRIMVM

phthiſim vero exiccantibus curabimus, febrisq; in nulla erit conſideratione, qm̄ in poſſibile eſt febrim tollere, eius cā ad huc relicta cuius cauſæ curatio eſt ipſa exiccatio, quę quidē febris officit. Tertiū uero ubi alter altro affectu piculoſior fu erit ut ſi febris cōtinēs (quę ſynochus no minat) cōiungat̄ reſolutiōi (quā paralyſi uocāt), tūc enim ſynochum extinguenti bus ī medijs, ac uenæ ſectiōe curabimus paralyſimq; deſpiciemus. At ubi mor bus cum accidenti coierit, tunc morbum curare incipiemus, niſi accidens morbo præualuerit, tunc enim accidenti curam adhibebimus. morbū uero non conſide rabimus, ut in uehementiſſimo ac diffi cili intēſtini colī dolore ubi quidem ppi namus quę ſtupefaciunt q̄uis p ſe colo, noceant. Itidem qñq; poſt ponimus ſan guinis emiſſionem, quāuis eſſet conue niens, p̄ptera quia adeſt inbecillitas uen triculi, aut præceſſerit alui deiectio uel nauſea præſens fuerit, & forte non tarda bimus